

S43.1_ Luxation des Akromioklavikulargelenkes

Fallzahlen pro Jahr	mit Diagnose	davon Hauptdiagnose
Hochgerechnete Anzahl Fälle pro Jahr	2037	1646
davon mit isolierter Diagnose	928	928

Soziodemographie	mit Diagnose	davon Hauptdiagnose
Durchschnittsalter	39.1	37.7
Median Alter	38.42	36.13
Anteil Berufsunfälle	13%	13%
Anteil Frauen	13%	12%

Heilkosten (in CHF)	mit Diagnose	davon Hauptdiagnose
Durchschnittliche Heilkosten	7717	5318
Median der Heilkosten	2631	2186
10% der Fälle haben Heilkosten von weniger als	448	385
10% der Fälle haben Heilkosten von mehr als	16401	13546
Anteil dieser 10% der Fälle an den gesamten HK	47%	36%

Versicherungsleistungen Total (in CHF)	mit Diagnose	davon Hauptdiagnose
Durchschnittliche Versicherungsleistungen	20526	12889
Median der Versicherungsleistungen	7990	6289
10% der Fälle haben VL von weniger als	801	621
10% der Fälle haben VL von mehr als	38032	30569
Anteil dieser 10% der Fälle an den gesamten VL	56%	41%


Entschädigte Tage	mit Diagnose	davon Hauptdiagnose
Anzahl der Fälle mit entschädigten Tagen pro Jahr	1553	1246
Anteil der Fälle mit entschädigten Tagen pro Jahr	76%	76%
Durchschnittliche Zahl entschädigter Tage bei den Taggeldfällen	81	61
Durchschnittliche Zahl entschädigter Tage über alle Unfälle	62	46
Median der entschädigten Tage (Renten nicht berücksichtigt)	27	22

Renten	mit Diagnose	davon Hauptdiagnose
Durchschnittliche Anzahl Todesfälle pro Jahr	0	0
Durchschnittliche Anzahl der Fälle mit IR pro Jahr	14	2
Anteil der Fälle mit IR	0.7%	0.1%
Durchschnittlicher Invaliditätsgrad über alle Fälle	0.2%	0.0%
Durchschnittlicher Invaliditätsgrad der IR-Fälle	29%	20%
Summe der Invaliditätsgrade pro Jahr	388%	36%
Anteil der Fälle mit IE	2%	1%


Hochrechnung aus einer Stichprobe von 742 anerkannten UVG-Unfällen mit Diagnose(n) S43.1_ in den Jahren 2014-2018, davon 478 mit dieser(n) Hauptdiagnose(n)
 Als traumatische Hauptdiagnose wird bei Fällen mit mehreren Verletzungen diejenige betrachtet, für die im Mittel über alle Fälle mit dieser Diagnose die höchsten Heilkosten beobachtet werden.

S43.1_ Luxation des Akromioklavikulargelenkes

Verteilung der Heilkosten und der gesamten Versicherungsleistungen



Entschädigte Tage bis zur Wiederaufnahme der Arbeit oder bis zum Festsetzen einer Rente



Lesebeispiele:

Nach drei Monaten sind 17% der Verunfallten noch nicht arbeitsfähig, nach 1000 Tagen noch 0.2%.
 Bei 0.1% der Fälle wurde innerhalb von 1000 Tagen eine Rente gesprochen, davon in 0.1% Invalidenrenten und 0.0% wegen Todesfällen.