

lésion traumatique superficielle du cuir chevelu

Filtre: Cas acceptés avec diagnostic S00.0_

Nombre de cas par année	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Extrapolation du nombre de cas par année	2'756	1'917
dont cas avec diagnostic isolé	1'140	1'140

Socio-démographie	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Age moyen	39.0	38.3
Age médian	39.0	37.8
Proportion des accidents professionnels	28%	30%
part des femmes	48%	50%

Frais de traitement (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des frais de traitement	2'956	833
Médiane des frais de traitement	472	273
10% des cas ont des frais de traitement inférieurs à	67	57
10% des cas ont des frais de traitement supérieurs à	3'836	2'100
Part de ces 10% de cas par rapport au total des frais	77%	52%

Total des prestations d'assurance (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des prestations	6'671	1'750
Médiane des prestations	706	385
10% des cas ont des prestations inférieures à	73	58
10% des cas ont des prestations supérieures à	8'132	3'474
Part de ces 10% de cas par rapport au total des prestations	82%	66%

Jours indemnisés	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre de cas avec indemnité journalière par année	1'139	609
Part de cas avec indemnité journalière	41%	32%
Moyenne des jours indemnisés (sans rentes)	19	6
Médiane des jours indemnisés (sans rentes)	0	0



Rentes	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre moyen de cas avec décès par année	1	0
Nombre moyen de cas avec IR par année	5	0
Part de cas avec IR	0%	0%
Degré d'invalidité moyen (tous les cas)	0.1%	0.0%
Degré d'invalidité moyen (cas avec IR)	54%	100%
Somme des degrés d'invalidité par année	258%	40%
Cas avec indemnités pour atteinte à l'intégrité	1%	0%

Extrapolation sur la base d'un échantillon de 766 cas reconnus LAA avec diagnostic(s) S000_ en 2011-2015, dont 482 avec ce(s) diagnostic(s) comme diagnostic principal

(1) Pour les cas avec plusieurs diagnostics traumatiques, le diagnostic traumatique principal est celui dont les frais de traitement sont les plus élevés par rapport à la moyenne de tous les cas présentant ledit diagnostic.

lésion traumatique superficielle du cuir chevelu

Filtre: Cas acceptés avec diagnostic traumatique principal S000_



(2) pour tous les cas avec diagnostic traumatique principal