

## Contusion de la paupière et de la région péri-oculaire

Filtre: Cas acceptés avec diagnostic S00.1\_

Nombre de cas par année	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Extrapolation du nombre de cas par année	2'889	1'808
dont cas avec diagnostic isolé	1'516	1'516

Socio-démographie	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Age moyen	38.3	37.3
Age médian	36.8	35.2
Proportion des accidents professionnels	22%	27%
part des femmes	33%	32%

Frais de traitement (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des frais de traitement	2'864	521
Médiane des frais de traitement	327	235
10% des cas ont des frais de traitement inférieurs à	49	40
10% des cas ont des frais de traitement supérieurs à	3'813	1'102
Part de ces 10% de cas par rapport au total des frais	81%	51%

Total des prestations d'assurance (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des prestations	6'544	722
Médiane des prestations	434	261
10% des cas ont des prestations inférieures à	77	52
10% des cas ont des prestations supérieures à	6'218	1'405
Part de ces 10% de cas par rapport au total des prestations	88%	57%

Jours indemnisés	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre de cas avec indemnité journalière par année	916	292
Part de cas avec indemnité journalière	32%	16%
Moyenne des jours indemnisés (sans rentes)	13	2
Médiane des jours indemnisés (sans rentes)	0	0



Rentes	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre moyen de cas avec décès par année	1	0
Nombre moyen de cas avec IR par année	8	0
Part de cas avec IR	0%	0%
Degré d'invalidité moyen (tous les cas)	0.2%	-%
Degré d'invalidité moyen (cas avec IR)	56%	-%
Somme des degrés d'invalidité par année	454%	-%
Cas avec indemnités pour atteinte à l'intégrité	1%	0%

Extrapolation sur la base d'un échantillon de 823 cas reconnus LAA avec diagnostic(s) S001\_ en 2011-2015, dont 454 avec ce(s) diagnostic(s) comme diagnostic principal

(1) Pour les cas avec plusieurs diagnostics traumatiques, le diagnostic traumatique principal est celui dont les frais de traitement sont les plus élevés par rapport à la moyenne de tous les cas présentant ledit diagnostic.

## Contusion de la paupière et de la région péri-oculaire

Filtre: Cas acceptés avec diagnostic traumatique principal S001\_



(2) pour tous les cas avec diagnostic traumatique principal