

## autres lésions traumatiques superficielles de la paupière et de la région péri-oculaire

Filtre: Cas acceptés avec diagnostic S00.2\_

Nombre de cas par année	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Extrapolation du nombre de cas par année	546	360
dont cas avec diagnostic isolé	296	296

Socio-démographie	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Age moyen	39.1	38.3
Age médian	38.7	38.0
Proportion des accidents professionnels	21%	23%
part des femmes	42%	41%

Frais de traitement (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des frais de traitement	1'310	312
Médiane des frais de traitement	257	169
10% des cas ont des frais de traitement inférieurs à	62	44
10% des cas ont des frais de traitement supérieurs à	2'150	689
Part de ces 10% de cas par rapport au total des frais	72%	40%

Total des prestations d'assurance (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des prestations	2'436	396
Médiane des prestations	321	177
10% des cas ont des prestations inférieures à	62	44
10% des cas ont des prestations supérieures à	3'696	958
Part de ces 10% de cas par rapport au total des prestations	79%	46%

Jours indemnisés	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre de cas avec indemnité journalière par année	141	32
Part de cas avec indemnité journalière	26%	9%
Moyenne des jours indemnisés (sans rentes)	11	1
Médiane des jours indemnisés (sans rentes)	0	0



Rentes	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre moyen de cas avec décès par année	0	0
Nombre moyen de cas avec IR par année	0	0
Part de cas avec IR	0%	0%
Degré d'invalidité moyen (tous les cas)	-%	-%
Degré d'invalidité moyen (cas avec IR)	-%	-%
Somme des degrés d'invalidité par année	-%	-%
Cas avec indemnités pour atteinte à l'intégrité	0%	0%

Extrapolation sur la base d'un échantillon de 144 cas reconnus LAA avec diagnostic(s) S002\_ en 2011-2015, dont 90 avec ce(s) diagnostic(s) comme diagnostic principal

(1) Pour les cas avec plusieurs diagnostics traumatiques, le diagnostic traumatique principal est celui dont les frais de traitement sont les plus élevés par rapport à la moyenne de tous les cas présentant ledit diagnostic.

## autres lésions traumatiques superficielles de la paupière et de la région péri-oculaire

Filtre: Cas acceptés avec diagnostic traumatique principal S002\_



(2) pour tous les cas avec diagnostic traumatique principal