

lésion traumatique superficielle du nez

filtre: Cas acceptés avec diagnostic S00.3

Nombre de cas par année	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Extrapolation du nombre de cas par année	3'364	1'708
dont cas avec diagnostic isolé	1'492	1'492

Socio-démographie	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Age moyen	36.4	33.1
Age médian	33.7	30.1
Proportion des accidents professionnels	25%	30%
part des femmes	45%	44%

Frais de traitement (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des frais de traitement	1'581	463
Médiane des frais de traitement	332	221
10% des cas ont des frais de traitement inférieurs à	57	41
10% des cas ont des frais de traitement supérieurs à	2'860	807
Part de ces 10% de cas par rapport au total des frais	71%	55%

Total des prestations d'assurance (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des prestations	3'162	604
Médiane des prestations	371	232
10% des cas ont des prestations inférieures à	60	41
10% des cas ont des prestations supérieures à	5'136	963
Part de ces 10% de cas par rapport au total des prestations	80%	61%

Jours indemnisés	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre de cas avec indemnité journalière par année	916	168
Part de cas avec indemnité journalière	27%	10%
Moyenne des jours indemnisés (sans rentes)	10	1
Médiane des jours indemnisés (sans rentes)	0	0



Rentes	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre moyen de cas avec décès par année	0	0
Nombre moyen de cas avec IR par année	3	0
Part de cas avec IR	0%	0%
Degré d'invalidité moyen (tous les cas)	0.0%	-%
Degré d'invalidité moyen (cas avec IR)	30%	-%
Somme des degrés d'invalidité par année	85%	-%
Cas avec indemnités pour atteinte à l'intégrité	0%	0%

Extrapolation sur la base d'un échantillon de 880 cas reconnus LAA avec diagnostic(s) S003_ en 2011-2015, dont 428 avec ce(s) diagnostic(s) comme diagnostic principal

(1) Pour les cas avec plusieurs diagnostics traumatiques, le diagnostic traumatique principal est celui dont les frais de traitement sont les plus élevés par rapport à la moyenne de tous les cas présentant ledit diagnostic.

lésion traumatique superficielle du nez

Filtre: Cas acceptés avec diagnostic traumatique principal S003_



(2) pour tous les cas avec diagnostic traumatique principal