

## plaie ouverte de la joue et de la région temporo-maxillaire

Filtre: Cas acceptés avec diagnostic S01.4\_

Nombre de cas par année	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Extrapolation du nombre de cas par année	410	305
dont cas avec diagnostic isolé	152	152

Socio-démographie	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Age moyen	38.0	37.3
Age médian	36.2	34.6
Proportion des accidents professionnels	33%	37%
part des femmes	22%	26%

Frais de traitement (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des frais de traitement	5'757	1'442
Médiane des frais de traitement	760	422
10% des cas ont des frais de traitement inférieurs à	177	144
10% des cas ont des frais de traitement supérieurs à	10'548	3'368
Part de ces 10% de cas par rapport au total des frais	74%	63%

Total des prestations d'assurance (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des prestations	12'852	1'912
Médiane des prestations	906	422
10% des cas ont des prestations inférieures à	177	144
10% des cas ont des prestations supérieures à	14'440	6'275
Part de ces 10% de cas par rapport au total des prestations	83%	63%

Jours indemnisés	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre de cas avec indemnité journalière par année	161	73
Part de cas avec indemnité journalière	39%	24%
Moyenne des jours indemnisés (sans rentes)	18	4
Médiane des jours indemnisés (sans rentes)	0	0



Rentes	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre moyen de cas avec décès par année	0	0
Nombre moyen de cas avec IR par année	3	0
Part de cas avec IR	1%	0%
Degré d'invalidité moyen (tous les cas)	0.4%	-%
Degré d'invalidité moyen (cas avec IR)	60%	-%
Somme des degrés d'invalidité par année	167%	-%
Cas avec indemnités pour atteinte à l'intégrité	2%	0%

Extrapolation sur la base d'un échantillon de 148 cas reconnus LAA avec diagnostic(s) S014\_ en 2011-2015, dont 81 avec ce(s) diagnostic(s) comme diagnostic principal

(1) Pour les cas avec plusieurs diagnostics traumatiques, le diagnostic traumatique principal est celui dont les frais de traitement sont les plus élevés par rapport à la moyenne de tous les cas présentant ledit diagnostic.

## plaie ouverte de la joue et de la région temporo-maxillaire

Filtre: Cas acceptés avec diagnostic traumatique principal S014\_



(2) pour tous les cas avec diagnostic traumatique principal