

fracture du maxillaire inférieur

Filtre: Cas acceptés avec diagnostic S02.6X

X représente un chiffre quelconque, y compris toutes les sous-catégories du code diagnostic S026.

Nombre de cas par année	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Extrapolation du nombre de cas par année	450	297
dont cas avec diagnostic isolé	80	80

Socio-démographie	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Age moyen	34.1	31.2
Age médian	29.2	25.7
Proportion des accidents professionnels	11%	10%
part des femmes	24%	23%

Frais de traitement (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des frais de traitement	37'774	17'960
Médiane des frais de traitement	16'181	14'381
10% des cas ont des frais de traitement inférieurs à	1'620	774
10% des cas ont des frais de traitement supérieurs à	47'971	28'221
Part de ces 10% de cas par rapport au total des frais	60%	35%

Total des prestations d'assurance (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des prestations	69'318	24'636
Médiane des prestations	22'776	18'521
10% des cas ont des prestations inférieures à	2'494	1'029
10% des cas ont des prestations supérieures à	74'715	38'166
Part de ces 10% de cas par rapport au total des prestations	71%	38%

Jours indemnisés	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre de cas avec indemnité journalière par année	377	229
Part de cas avec indemnité journalière	84%	77%
Moyenne des jours indemnisés (sans rentes)	119	61
Médiane des jours indemnisés (sans rentes)	30	19

Rentes	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre moyen de cas avec décès par année	2	0
Nombre moyen de cas avec IR par année	8	1
Part de cas avec IR	2%	0%
Degré d'invalidité moyen (tous les cas)	1.3%	0.0%
Degré d'invalidité moyen (cas avec IR)	70%	14%
Somme des degrés d'invalidité par année	582%	8%
Cas avec indemnités pour atteinte à l'intégrité	4%	0%



Extrapolation sur la base d'un échantillon de 219 cas reconnus LAA avec diagnostic(s) S026X en 2011-2015, dont 81 avec ce(s) diagnostic(s) comme diagnostic principal

(1) Pour les cas avec plusieurs diagnostics traumatiques, le diagnostic traumatique principal est celui dont les frais de traitement sont les plus élevés par rapport à la moyenne de tous les cas présentant ledit diagnostic.

fracture du maxillaire inférieur

Filtre: Cas acceptés avec diagnostic traumatique principal S026X

X représente un chiffre quelconque, y compris toutes les sous-catégories du code diagnostic S026.



(2) pour tous les cas avec diagnostic traumatique principal