

Luxation dentaire

filtre: Cas acceptés avec diagnostic S03.2

Nombre de cas par année	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Extrapolation du nombre de cas par année	2'513	2'260
dont cas avec diagnostic isolé	416	416

Socio-démographie	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Age moyen	40.2	40.0
Age médian	41.3	41.3
Proportion des accidents professionnels	26%	27%
part des femmes	34%	34%

Frais de traitement (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des frais de traitement	5'707	2'984
Médiane des frais de traitement	1'690	1'443
10% des cas ont des frais de traitement inférieurs à	178	167
10% des cas ont des frais de traitement supérieurs à	10'481	7'201
Part de ces 10% de cas par rapport au total des frais	62%	42%

Total des prestations d'assurance (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des prestations	8'709	3'549
Médiane des prestations	1'800	1'500
10% des cas ont des prestations inférieures à	184	177
10% des cas ont des prestations supérieures à	12'315	7'834
Part de ces 10% de cas par rapport au total des prestations	73%	48%

Jours indemnisés	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre de cas avec indemnité journalière par année	512	320
Part de cas avec indemnité journalière	20%	14%
Moyenne des jours indemnisés (sans rentes)	12	4
Médiane des jours indemnisés (sans rentes)	0	0



Rentes	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre moyen de cas avec décès par année	0	0
Nombre moyen de cas avec IR par année	5	0
Part de cas avec IR	0%	0%
Degré d'invalidité moyen (tous les cas)	0.1%	-%
Degré d'invalidité moyen (cas avec IR)	54%	-%
Somme des degrés d'invalidité par année	279%	-%
Cas avec indemnités pour atteinte à l'intégrité	1%	0%

Extrapolation sur la base d'un échantillon de 707 cas reconnus LAA avec diagnostic(s) S032_ en 2011-2015, dont 565 avec ce(s) diagnostic(s) comme diagnostic principal

(1) Pour les cas avec plusieurs diagnostics traumatiques, le diagnostic traumatique principal est celui dont les frais de traitement sont les plus élevés par rapport à la moyenne de tous les cas présentant ledit diagnostic.

Luxation dentaire

Filtre: Cas acceptés avec diagnostic traumatique principal S032_



(2) pour tous les cas avec diagnostic traumatique principal