

Contusion du globe oculaire et des tissus de l'orbite

Filtre: Cas acceptés avec diagnostic S05.1_

Nombre de cas par année	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Extrapolation du nombre de cas par année	1'214	1'011
dont cas avec diagnostic isolé	524	524

Socio-démographie	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Age moyen	38.3	38.4
Age médian	37.1	37.2
Proportion des accidents professionnels	28%	32%
part des femmes	26%	27%

Frais de traitement (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des frais de traitement	4'013	1'488
Médiane des frais de traitement	566	449
10% des cas ont des frais de traitement inférieurs à	98	91
10% des cas ont des frais de traitement supérieurs à	6'351	3'027
Part de ces 10% de cas par rapport au total des frais	80%	65%

Total des prestations d'assurance (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des prestations	11'669	3'498
Médiane des prestations	752	583
10% des cas ont des prestations inférieures à	114	99
10% des cas ont des prestations supérieures à	12'942	4'060
Part de ces 10% de cas par rapport au total des prestations	89%	80%

Jours indemnisés	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre de cas avec indemnité journalière par année	476	317
Part de cas avec indemnité journalière	39%	31%
Moyenne des jours indemnisés (sans rentes)	21	8
Médiane des jours indemnisés (sans rentes)	0	0



Rentes	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre moyen de cas avec décès par année	0	0
Nombre moyen de cas avec IR par année	8	2
Part de cas avec IR	1%	0%
Degré d'invalidité moyen (tous les cas)	0.4%	0.0%
Degré d'invalidité moyen (cas avec IR)	53%	24%
Somme des degrés d'invalidité par année	456%	38%
Cas avec indemnités pour atteinte à l'intégrité	3%	1%

Extrapolation sur la base d'un échantillon de 467 cas reconnus LAA avec diagnostic(s) S051_ en 2011-2015, dont 322 avec ce(s) diagnostic(s) comme diagnostic principal

(1) Pour les cas avec plusieurs diagnostics traumatiques, le diagnostic traumatique principal est celui dont les frais de traitement sont les plus élevés par rapport à la moyenne de tous les cas présentant ledit diagnostic.

Contusion du globe oculaire et des tissus de l'orbite

Filtre: Cas acceptés avec diagnostic traumatique principal S051_



(2) pour tous les cas avec diagnostic traumatique principal