

lacération et rupture oculaires avec protrusion ou perte de tissu intra-oculaire

Filtre: Cas acceptés avec diagnostic S05.2_

Nombre de cas par année	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Extrapolation du nombre de cas par année	19	15
dont cas avec diagnostic isolé	0	0

Socio-démographie	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Age moyen	39.9	39.1
Age médian	47.7	49.8
Proportion des accidents professionnels	45%	49%
part des femmes	26%	30%

Frais de traitement (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des frais de traitement	26'863	21'454
Médiane des frais de traitement	14'957	13'725
10% des cas ont des frais de traitement inférieurs à	6'580	6'580
10% des cas ont des frais de traitement supérieurs à	54'594	42'295
Part de ces 10% de cas par rapport au total des frais	39%	35%

Total des prestations d'assurance (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des prestations	106'226	86'501
Médiane des prestations	46'834	17'593
10% des cas ont des prestations inférieures à	6'631	6'631
10% des cas ont des prestations supérieures à	259'973	130'677
Part de ces 10% de cas par rapport au total des prestations	59%	63%

Jours indemnisés	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre de cas avec indemnité journalière par année	19	15
Part de cas avec indemnité journalière	99%	99%
Moyenne des jours indemnisés (sans rentes)	187	142
Médiane des jours indemnisés (sans rentes)	36	22



Rentes	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre moyen de cas avec décès par année	0	0
Nombre moyen de cas avec IR par année	2	1
Part de cas avec IR	9%	8%
Degré d'invalidité moyen (tous les cas)	3.4%	2.8%
Degré d'invalidité moyen (cas avec IR)	32%	34%
Somme des degrés d'invalidité par année	65%	44%
Cas avec indemnités pour atteinte à l'intégrité	58%	48%

Extrapolation sur la base d'un échantillon de 57 cas reconnus LAA avec diagnostic(s) S052_ en 2011-2015, dont 39 avec ce(s) diagnostic(s) comme diagnostic principal

(1) Pour les cas avec plusieurs diagnostics traumatiques, le diagnostic traumatique principal est celui dont les frais de traitement sont les plus élevés par rapport à la moyenne de tous les cas présentant ledit diagnostic.

lacération et rupture oculaires avec protrusion ou perte de tissu intra-oculaire

Filtre: Cas acceptés avec diagnostic traumatique principal S052_



(2) pour tous les cas avec diagnostic traumatique principal