

rupture traumatique du tympan

filtre: Cas acceptés avec diagnostic S09.2

Nombre de cas par année	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Extrapolation du nombre de cas par année	773	711
dont cas avec diagnostic isolé	528	528

Socio-démographie	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Age moyen	33.9	33.9
Age médian	31.3	31.7
Proportion des accidents professionnels	12%	10%
part des femmes	20%	20%

Frais de traitement (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des frais de traitement	1'838	901
Médiane des frais de traitement	465	437
10% des cas ont des frais de traitement inférieurs à	116	113
10% des cas ont des frais de traitement supérieurs à	1'275	1'095
Part de ces 10% de cas par rapport au total des frais	76%	55%

Total des prestations d'assurance (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des prestations	5'458	1'657
Médiane des prestations	519	444
10% des cas ont des prestations inférieures à	124	116
10% des cas ont des prestations supérieures à	2'133	1'754
Part de ces 10% de cas par rapport au total des prestations	90%	72%

Jours indemnisés	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre de cas avec indemnité journalière par année	160	110
Part de cas avec indemnité journalière	21%	15%
Moyenne des jours indemnisés (sans rentes)	10	4
Médiane des jours indemnisés (sans rentes)	0	0



Rentes	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre moyen de cas avec décès par année	0	0
Nombre moyen de cas avec IR par année	2	0
Part de cas avec IR	0%	0%
Degré d'invalidité moyen (tous les cas)	0.2%	0.0%
Degré d'invalidité moyen (cas avec IR)	70%	50%
Somme des degrés d'invalidité par année	169%	10%
Cas avec indemnités pour atteinte à l'intégrité	1%	0%

Extrapolation sur la base d'un échantillon de 237 cas reconnus LAA avec diagnostic(s) S092_ en 2011-2015, dont 194 avec ce(s) diagnostic(s) comme diagnostic principal

(1) Pour les cas avec plusieurs diagnostics traumatiques, le diagnostic traumatique principal est celui dont les frais de traitement sont les plus élevés par rapport à la moyenne de tous les cas présentant ledit diagnostic.

rupture traumatique du tympan

Filtre: Cas acceptés avec diagnostic traumatique principal S092_



(2) pour tous les cas avec diagnostic traumatique principal