

## autres lésions traumatiques précisées de la tête

Filter: Cas acceptés avec diagnostic S09.8\_

Nombre de cas par année	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Extrapolation du nombre de cas par année	370	311
dont cas avec diagnostic isolé	172	172

Socio-démographie	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Age moyen	35.4	34.6
Age médian	32.9	31.3
Proportion des accidents professionnels	27%	26%
part des femmes	34%	37%

Frais de traitement (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des frais de traitement	8'957	1'837
Médiane des frais de traitement	529	360
10% des cas ont des frais de traitement inférieurs à	90	64
10% des cas ont des frais de traitement supérieurs à	16'740	4'447
Part de ces 10% de cas par rapport au total des frais	82%	69%

Total des prestations d'assurance (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des prestations	38'206	5'341
Médiane des prestations	662	389
10% des cas ont des prestations inférieures à	100	90
10% des cas ont des prestations supérieures à	29'078	12'446
Part de ces 10% de cas par rapport au total des prestations	92%	84%

Jours indemnisés	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre de cas avec indemnité journalière par année	137	83
Part de cas avec indemnité journalière	37%	27%
Moyenne des jours indemnisés (sans rentes)	77	15
Médiane des jours indemnisés (sans rentes)	0	0



Rentes	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre moyen de cas avec décès par année	0	0
Nombre moyen de cas avec IR par année	8	0
Part de cas avec IR	2%	0%
Degré d'invalidité moyen (tous les cas)	1.0%	0.0%
Degré d'invalidité moyen (cas avec IR)	48%	50%
Somme des degrés d'invalidité par année	362%	10%
Cas avec indemnités pour atteinte à l'intégrité	5%	1%

Extrapolation sur la base d'un échantillon de 180 cas reconnus LAA avec diagnostic(s) S098\_ en 2011-2015, dont 94 avec ce(s) diagnostic(s) comme diagnostic principal

(1) Pour les cas avec plusieurs diagnostics traumatiques, le diagnostic traumatique principal est celui dont les frais de traitement sont les plus élevés par rapport à la moyenne de tous les cas présentant ledit diagnostic.

## autres lésions traumatiques précisées de la tête

Filtre: Cas acceptés avec diagnostic traumatique principal S098\_



(2) pour tous les cas avec diagnostic traumatique principal