

## fractures multiples fermées du rachis cervical

Filter: Cas acceptés avec diagnostic S12.70

Nombre de cas par année	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Extrapolation du nombre de cas par année	107	62
dont cas avec diagnostic isolé	0	0

Socio-démographie	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Age moyen	42.5	42.6
Age médian	44.3	44.0
Proportion des accidents professionnels	15%	21%
part des femmes	15%	19%

Frais de traitement (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des frais de traitement	142'966	62'338
Médiane des frais de traitement	34'693	25'864
10% des cas ont des frais de traitement inférieurs à	4'894	1'790
10% des cas ont des frais de traitement supérieurs à	488'702	132'584
Part de ces 10% de cas par rapport au total des frais	60%	52%

Total des prestations d'assurance (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des prestations	433'252	176'106
Médiane des prestations	76'810	55'088
10% des cas ont des prestations inférieures à	16'722	5'985
10% des cas ont des prestations supérieures à	1'735'690	431'675
Part de ces 10% de cas par rapport au total des prestations	57%	64%

Jours indemnisés	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre de cas avec indemnité journalière par année	100	57
Part de cas avec indemnité journalière	93%	91%
Moyenne des jours indemnisés (sans rentes)	313	227
Médiane des jours indemnisés (sans rentes)	201	192



Rentes	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre moyen de cas avec décès par année	4	2
Nombre moyen de cas avec IR par année	22	5
Part de cas avec IR	20%	9%
Degré d'invalidité moyen (tous les cas)	14.4%	4.1%
Degré d'invalidité moyen (cas avec IR)	72%	47%
Somme des degrés d'invalidité par année	1'543%	255%
Cas avec indemnités pour atteinte à l'intégrité	40%	32%

Extrapolation sur la base d'un échantillon de 249 cas reconnus LAA avec diagnostic(s) S1270 en 2011-2015, dont 120 avec ce(s) diagnostic(s) comme diagnostic principal

(1) Pour les cas avec plusieurs diagnostics traumatiques, le diagnostic traumatique principal est celui dont les frais de traitement sont les plus élevés par rapport à la moyenne de tous les cas présentant ledit diagnostic.

## fractures multiples fermées du rachis cervical

Filtre: Cas acceptés avec diagnostic traumatique principal S1270



(2) pour tous les cas avec diagnostic traumatique principal