

luxation d'une vertèbre cervicale

filtre: Cas acceptés avec diagnostic S13.1

Nombre de cas par année	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Extrapolation du nombre de cas par année	118	82
dont cas avec diagnostic isolé	32	32

Socio-démographie	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Age moyen	38.5	39.3
Age médian	35.3	35.3
Proportion des accidents professionnels	13%	6%
part des femmes	28%	30%

Frais de traitement (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des frais de traitement	65'636	14'638
Médiane des frais de traitement	2'929	1'499
10% des cas ont des frais de traitement inférieurs à	0	0
10% des cas ont des frais de traitement supérieurs à	100'598	44'635
Part de ces 10% de cas par rapport au total des frais	81%	59%

Total des prestations d'assurance (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des prestations	196'130	39'392
Médiane des prestations	4'446	1'602
10% des cas ont des prestations inférieures à	95	239
10% des cas ont des prestations supérieures à	443'330	76'810
Part de ces 10% de cas par rapport au total des prestations	86%	75%

Jours indemnisés	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre de cas avec indemnité journalière par année	85	54
Part de cas avec indemnité journalière	72%	66%
Moyenne des jours indemnisés (sans rentes)	147	76
Médiane des jours indemnisés (sans rentes)	36	10



Rentes	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre moyen de cas avec décès par année	1	0
Nombre moyen de cas avec IR par année	11	3
Part de cas avec IR	10%	3%
Degré d'invalidité moyen (tous les cas)	5.9%	1.2%
Degré d'invalidité moyen (cas avec IR)	62%	37%
Somme des degrés d'invalidité par année	690%	95%
Cas avec indemnités pour atteinte à l'intégrité	17%	7%

Extrapolation sur la base d'un échantillon de 133 cas reconnus LAA avec diagnostic(s) S131_ en 2011-2015, dont 49 avec ce(s) diagnostic(s) comme diagnostic principal

(1) Pour les cas avec plusieurs diagnostics traumatiques, le diagnostic traumatique principal est celui dont les frais de traitement sont les plus élevés par rapport à la moyenne de tous les cas présentant ledit diagnostic.

luxation d'une vertèbre cervicale

Filtre: Cas acceptés avec diagnostic traumatique principal S131_



(2) pour tous les cas avec diagnostic traumatique principal