

entorse et foulure du rachis cervical

Filtre: Cas acceptés avec diagnostic S13.4_

Nombre de cas par année	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Extrapolation du nombre de cas par année	21'739	17'786
dont cas avec diagnostic isolé	10'852	10'852

Socio-démographie	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Age moyen	36.2	35.9
Age médian	34.4	33.9
Proportion des accidents professionnels	15%	15%
part des femmes	54%	55%

Frais de traitement (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des frais de traitement	2'560	1'598
Médiane des frais de traitement	794	664
10% des cas ont des frais de traitement inférieurs à	126	109
10% des cas ont des frais de traitement supérieurs à	4'765	3'360
Part de ces 10% de cas par rapport au total des frais	63%	54%

Total des prestations d'assurance (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des prestations	6'567	3'692
Médiane des prestations	1'249	1'009
10% des cas ont des prestations inférieures à	175	155
10% des cas ont des prestations supérieures à	10'886	7'033
Part de ces 10% de cas par rapport au total des prestations	74%	65%

Jours indemnisés	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre de cas avec indemnité journalière par année	10'844	8'001
Part de cas avec indemnité journalière	50%	45%
Moyenne des jours indemnisés (sans rentes)	24	16
Médiane des jours indemnisés (sans rentes)	0	0



Rentes	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre moyen de cas avec décès par année	1	0
Nombre moyen de cas avec IR par année	23	1
Part de cas avec IR	0%	0%
Degré d'invalidité moyen (tous les cas)	0.0%	0.0%
Degré d'invalidité moyen (cas avec IR)	39%	24%
Somme des degrés d'invalidité par année	926%	31%
Cas avec indemnités pour atteinte à l'intégrité	0%	0%

Extrapolation sur la base d'un échantillon de 5770 cas reconnus LAA avec diagnostic(s) S134_ en 2011-2015, dont 4475 avec ce(s) diagnostic(s) comme diagnostic principal

(1) Pour les cas avec plusieurs diagnostics traumatiques, le diagnostic traumatique principal est celui dont les frais de traitement sont les plus élevés par rapport à la moyenne de tous les cas présentant ledit diagnostic.

entorse et foulure du rachis cervical

Filtre: Cas acceptés avec diagnostic traumatique principal S134_



(2) pour tous les cas avec diagnostic traumatique principal