

luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments au niveau du cou

Filtre: Cas acceptés avec diagnostic S13.XX

X représente un chiffre quelconque, y compris toutes les sous-catégories du code diagnostic S13.

Nombre de cas par année	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Extrapolation du nombre de cas par année	22'015	18'036
dont cas avec diagnostic isolé	10'948	10'948

Socio-démographie	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Age moyen	36.2	36.0
Age médian	34.3	33.9
Proportion des accidents professionnels	15%	15%
part des femmes	54%	55%

Frais de traitement (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des frais de traitement	3'006	1'690
Médiane des frais de traitement	793	664
10% des cas ont des frais de traitement inférieurs à	122	106
10% des cas ont des frais de traitement supérieurs à	4'884	3'416
Part de ces 10% de cas par rapport au total des frais	68%	56%

Total des prestations d'assurance (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des prestations	7'914	3'963
Médiane des prestations	1'249	1'009
10% des cas ont des prestations inférieures à	173	155
10% des cas ont des prestations supérieures à	11'181	7'253
Part de ces 10% de cas par rapport au total des prestations	78%	67%

Jours indemnisés	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre de cas avec indemnité journalière par année	11'003	8'138
Part de cas avec indemnité journalière	50%	45%
Moyenne des jours indemnisés (sans rentes)	24	16
Médiane des jours indemnisés (sans rentes)	0	0

Rentes	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre moyen de cas avec décès par année	3	0
Nombre moyen de cas avec IR par année	40	5
Part de cas avec IR	0%	0%
Degré d'invalidité moyen (tous les cas)	0.1%	0.0%
Degré d'invalidité moyen (cas avec IR)	48%	30%
Somme des degrés d'invalidité par année	1'926%	153%
Cas avec indemnités pour atteinte à l'intégrité	0%	0%



Extrapolation sur la base d'un échantillon de 5992 cas reconnus LAA avec diagnostic(s) S13XX en 2011-2015, dont 4583 avec ce(s) diagnostic(s) comme diagnostic principal

(1) Pour les cas avec plusieurs diagnostics traumatiques, le diagnostic traumatique principal est celui dont les frais de traitement sont les plus élevés par rapport à la moyenne de tous les cas présentant ledit diagnostic.

luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments au niveau du cou

Filter: Cas acceptés avec diagnostic traumatique principal S13XX

X représente un chiffre quelconque, y compris toutes les sous-catégories du code diagnostic S13.



(2) pour tous les cas avec diagnostic traumatique principal