

commotion et oedème de la moelle cervicale

filtre: Cas acceptés avec diagnostic S14.0

Nombre de cas par année	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Extrapolation du nombre de cas par année	70	54
dont cas avec diagnostic isolé	0	0

Socio-démographie	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Age moyen	42.7	44.3
Age médian	38.7	41.1
Proportion des accidents professionnels	22%	18%
part des femmes	21%	24%

Frais de traitement (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des frais de traitement	101'685	58'258
Médiane des frais de traitement	10'679	10'083
10% des cas ont des frais de traitement inférieurs à	228	2'499
10% des cas ont des frais de traitement supérieurs à	213'526	87'130
Part de ces 10% de cas par rapport au total des frais	70%	73%

Total des prestations d'assurance (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des prestations	305'821	215'044
Médiane des prestations	19'926	19'271
10% des cas ont des prestations inférieures à	2'879	5'857
10% des cas ont des prestations supérieures à	1'114'482	623'139
Part de ces 10% de cas par rapport au total des prestations	69%	80%

Jours indemnisés	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre de cas avec indemnité journalière par année	61	49
Part de cas avec indemnité journalière	86%	91%
Moyenne des jours indemnisés (sans rentes)	287	272
Médiane des jours indemnisés (sans rentes)	90	72



Rentes	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre moyen de cas avec décès par année	3	1
Nombre moyen de cas avec IR par année	10	5
Part de cas avec IR	14%	10%
Degré d'invalidité moyen (tous les cas)	10.1%	7.1%
Degré d'invalidité moyen (cas avec IR)	70%	70%
Somme des degrés d'invalidité par année	706%	383%
Cas avec indemnités pour atteinte à l'intégrité	21%	15%

Extrapolation sur la base d'un échantillon de 104 cas reconnus LAA avec diagnostic(s) S140_ en 2011-2015, dont 62 avec ce(s) diagnostic(s) comme diagnostic principal

(1) Pour les cas avec plusieurs diagnostics traumatiques, le diagnostic traumatique principal est celui dont les frais de traitement sont les plus élevés par rapport à la moyenne de tous les cas présentant ledit diagnostic.

commotion et oedème de la moelle cervicale

Filtre: Cas acceptés avec diagnostic traumatique principal S140_



(2) pour tous les cas avec diagnostic traumatique principal