

lésions traumatiques de la moelle cervicale, autres et non précisées

Filter: Cas acceptés avec diagnostic S14.1_

Nombre de cas par année	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Extrapolation du nombre de cas par année	21	20
dont cas avec diagnostic isolé	0	0

Socio-démographie	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Age moyen	40.2	39.8
Age médian	37.1	36.7
Proportion des accidents professionnels	12%	12%
part des femmes	12%	11%

Frais de traitement (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des frais de traitement	543'642	538'115
Médiane des frais de traitement	553'640	550'864
10% des cas ont des frais de traitement inférieurs à	20'851	8'420
10% des cas ont des frais de traitement supérieurs à	1'014'175	1'014'175
Part de ces 10% de cas par rapport au total des frais	25%	24%

Total des prestations d'assurance (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des prestations	1'596'214	1'580'381
Médiane des prestations	1'597'034	1'582'951
10% des cas ont des prestations inférieures à	226'378	211'358
10% des cas ont des prestations supérieures à	2'913'329	2'964'690
Part de ces 10% de cas par rapport au total des prestations	22%	21%

Jours indemnisés	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre de cas avec indemnité journalière par année	19	18
Part de cas avec indemnité journalière	90%	91%
Moyenne des jours indemnisés (sans rentes)	566	556
Médiane des jours indemnisés (sans rentes)	550	539



Rentes	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre moyen de cas avec décès par année	3	3
Nombre moyen de cas avec IR par année	14	13
Part de cas avec IR	66%	66%
Degré d'invalidité moyen (tous les cas)	52.4%	52.1%
Degré d'invalidité moyen (cas avec IR)	80%	80%
Somme des degrés d'invalidité par année	1'078%	1'022%
Cas avec indemnités pour atteinte à l'intégrité	85%	86%

Extrapolation sur la base d'un échantillon de 103 cas reconnus LAA avec diagnostic(s) S141_ en 2011-2015, dont 98 avec ce(s) diagnostic(s) comme diagnostic principal

(1) Pour les cas avec plusieurs diagnostics traumatiques, le diagnostic traumatique principal est celui dont les frais de traitement sont les plus élevés par rapport à la moyenne de tous les cas présentant ledit diagnostic.

lésions traumatiques de la moelle cervicale, autres et non précisées

Filtre: Cas acceptés avec diagnostic traumatique principal S141_



(2) pour tous les cas avec diagnostic traumatique principal