

lésion traumatique des muscles et des tendons au niveau du cou

Filtre: Cas acceptés avec diagnostic S16.____

Nombre de cas par année	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Extrapolation du nombre de cas par année	366	236
dont cas avec diagnostic isolé	136	136

Socio-démographie	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Age moyen	35.0	34.4
Age médian	31.0	29.5
Proportion des accidents professionnels	31%	25%
part des femmes	42%	41%

Frais de traitement (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des frais de traitement	2'352	578
Médiane des frais de traitement	338	263
10% des cas ont des frais de traitement inférieurs à	97	78
10% des cas ont des frais de traitement supérieurs à	2'478	1'505
Part de ces 10% de cas par rapport au total des frais	78%	37%

Total des prestations d'assurance (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des prestations	4'973	1'079
Médiane des prestations	781	462
10% des cas ont des prestations inférieures à	100	85
10% des cas ont des prestations supérieures à	7'649	3'090
Part de ces 10% de cas par rapport au total des prestations	80%	43%

Jours indemnisés	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre de cas avec indemnité journalière par année	170	96
Part de cas avec indemnité journalière	46%	41%
Moyenne des jours indemnisés (sans rentes)	14	5
Médiane des jours indemnisés (sans rentes)	0	0



Rentes	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre moyen de cas avec décès par année	0	0
Nombre moyen de cas avec IR par année	0	0
Part de cas avec IR	0%	0%
Degré d'invalidité moyen (tous les cas)	0.1%	-%
Degré d'invalidité moyen (cas avec IR)	54%	-%
Somme des degrés d'invalidité par année	21%	-%
Cas avec indemnités pour atteinte à l'intégrité	0%	0%

Extrapolation sur la base d'un échantillon de 100 cas reconnus LAA avec diagnostic(s) S16____
 en 2011-2015, dont 59 avec ce(s) diagnostic(s) comme diagnostic principal

(1) Pour les cas avec plusieurs diagnostics traumatiques, le diagnostic traumatique principal est celui dont les frais de traitement sont les plus élevés par rapport à la moyenne de tous les cas présentant ledit diagnostic.

lésion traumatique des muscles et des tendons au niveau du cou

Filtre: Cas acceptés avec diagnostic traumatique principal S16__



(2) pour tous les cas avec diagnostic traumatique principal