

lésion traumatique du cou, sans précision

Filtre: Cas acceptés avec diagnostic S19.9_

Nombre de cas par année	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Extrapolation du nombre de cas par année	2'086	1'476
dont cas avec diagnostic isolé	708	708

Socio-démographie	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Age moyen	36.6	35.5
Age médian	35.4	34.0
Proportion des accidents professionnels	19%	19%
part des femmes	54%	53%

Frais de traitement (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des frais de traitement	842	614
Médiane des frais de traitement	388	320
10% des cas ont des frais de traitement inférieurs à	25	0
10% des cas ont des frais de traitement supérieurs à	1'822	1'420
Part de ces 10% de cas par rapport au total des frais	51%	46%

Total des prestations d'assurance (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des prestations	1'787	1'221
Médiane des prestations	479	388
10% des cas ont des prestations inférieures à	57	0
10% des cas ont des prestations supérieures à	2'921	2'120
Part de ces 10% de cas par rapport au total des prestations	69%	64%

Jours indemnisés	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre de cas avec indemnité journalière par année	465	296
Part de cas avec indemnité journalière	22%	20%
Moyenne des jours indemnisés (sans rentes)	6	4
Médiane des jours indemnisés (sans rentes)	0	0



Rentes	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre moyen de cas avec décès par année	0	0
Nombre moyen de cas avec IR par année	0	0
Part de cas avec IR	0%	0%
Degré d'invalidité moyen (tous les cas)	0.0%	0.0%
Degré d'invalidité moyen (cas avec IR)	20%	20%
Somme des degrés d'invalidité par année	4%	4%
Cas avec indemnités pour atteinte à l'intégrité	0%	0%

Extrapolation sur la base d'un échantillon de 530 cas reconnus LAA avec diagnostic(s) S199_ en 2011-2015, dont 371 avec ce(s) diagnostic(s) comme diagnostic principal

(1) Pour les cas avec plusieurs diagnostics traumatiques, le diagnostic traumatique principal est celui dont les frais de traitement sont les plus élevés par rapport à la moyenne de tous les cas présentant ledit diagnostic.

lésion traumatique du cou, sans précision

Filtre: Cas acceptés avec diagnostic traumatique principal S199_



(2) pour tous les cas avec diagnostic traumatique principal