

Contusion du thorax

filtre: Cas acceptés avec diagnostic S20.2

Nombre de cas par année	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Extrapolation du nombre de cas par année	25'991	16'228
dont cas avec diagnostic isolé	14'900	14'900

Socio-démographie	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Age moyen	41.0	40.9
Age médian	41.5	41.2
Proportion des accidents professionnels	24%	25%
part des femmes	31%	26%

Frais de traitement (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des frais de traitement	1'688	453
Médiane des frais de traitement	334	243
10% des cas ont des frais de traitement inférieurs à	74	59
10% des cas ont des frais de traitement supérieurs à	3'003	850
Part de ces 10% de cas par rapport au total des frais	73%	49%

Total des prestations d'assurance (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des prestations	4'445	1'233
Médiane des prestations	675	337
10% des cas ont des prestations inférieures à	95	74
10% des cas ont des prestations supérieures à	7'152	3'142
Part de ces 10% de cas par rapport au total des prestations	75%	55%

Jours indemnisés	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre de cas avec indemnité journalière par année	12'000	5'748
Part de cas avec indemnité journalière	46%	35%
Moyenne des jours indemnisés (sans rentes)	16	6
Médiane des jours indemnisés (sans rentes)	0	0



Rentes	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre moyen de cas avec décès par année	1	0
Nombre moyen de cas avec IR par année	30	0
Part de cas avec IR	0%	0%
Degré d'invalidité moyen (tous les cas)	0.0%	-%
Degré d'invalidité moyen (cas avec IR)	28%	-%
Somme des degrés d'invalidité par année	870%	-%
Cas avec indemnités pour atteinte à l'intégrité	0%	0%

Extrapolation sur la base d'un échantillon de 6931 cas reconnus LAA avec diagnostic(s) S20.2_ en 2011-2015, dont 4058 avec ce(s) diagnostic(s) comme diagnostic principal

(1) Pour les cas avec plusieurs diagnostics traumatiques, le diagnostic traumatique principal est celui dont les frais de traitement sont les plus élevés par rapport à la moyenne de tous les cas présentant ledit diagnostic.

Contusion du thorax

Filtre: Cas acceptés avec diagnostic traumatique principal S202_



(2) pour tous les cas avec diagnostic traumatique principal