

entorse et foulure du rachis dorsal

Filter: Cas acceptés avec diagnostic S23.3_

Nombre de cas par année	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Extrapolation du nombre de cas par année	923	668
dont cas avec diagnostic isolé	264	264

Socio-démographie	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Age moyen	36.3	36.1
Age médian	34.6	34.2
Proportion des accidents professionnels	29%	31%
part des femmes	45%	42%

Frais de traitement (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des frais de traitement	3'603	1'336
Médiane des frais de traitement	662	483
10% des cas ont des frais de traitement inférieurs à	121	97
10% des cas ont des frais de traitement supérieurs à	4'933	3'058
Part de ces 10% de cas par rapport au total des frais	75%	54%

Total des prestations d'assurance (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des prestations	9'135	2'779
Médiane des prestations	1'190	867
10% des cas ont des prestations inférieures à	171	146
10% des cas ont des prestations supérieures à	11'758	5'829
Part de ces 10% de cas par rapport au total des prestations	79%	59%

Jours indemnisés	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre de cas avec indemnité journalière par année	487	296
Part de cas avec indemnité journalière	53%	44%
Moyenne des jours indemnisés (sans rentes)	24	13
Médiane des jours indemnisés (sans rentes)	2	0



Rentes	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre moyen de cas avec décès par année	0	0
Nombre moyen de cas avec IR par année	4	0
Part de cas avec IR	0%	0%
Degré d'invalidité moyen (tous les cas)	0.2%	0.0%
Degré d'invalidité moyen (cas avec IR)	38%	12%
Somme des degrés d'invalidité par année	167%	2%
Cas avec indemnités pour atteinte à l'intégrité	1%	0%

Extrapolation sur la base d'un échantillon de 285 cas reconnus LAA avec diagnostic(s) S233_ en 2011-2015, dont 169 avec ce(s) diagnostic(s) comme diagnostic principal

(1) Pour les cas avec plusieurs diagnostics traumatiques, le diagnostic traumatique principal est celui dont les frais de traitement sont les plus élevés par rapport à la moyenne de tous les cas présentant ledit diagnostic.

entorse et foulure du rachis dorsal

Filtre: Cas acceptés avec diagnostic traumatique principal S233_



(2) pour tous les cas avec diagnostic traumatique principal