

entorse et foulure des côtes et du sternum

Filtre: Cas acceptés avec diagnostic S23.4_

Nombre de cas par année	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Extrapolation du nombre de cas par année	281	196
dont cas avec diagnostic isolé	180	180

Socio-démographie	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Age moyen	40.9	39.7
Age médian	39.7	37.5
Proportion des accidents professionnels	31%	39%
part des femmes	37%	31%

Frais de traitement (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des frais de traitement	599	480
Médiane des frais de traitement	248	239
10% des cas ont des frais de traitement inférieurs à	29	0
10% des cas ont des frais de traitement supérieurs à	1'511	1'900
Part de ces 10% de cas par rapport au total des frais	56%	50%

Total des prestations d'assurance (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des prestations	1'543	1'122
Médiane des prestations	475	385
10% des cas ont des prestations inférieures à	91	83
10% des cas ont des prestations supérieures à	3'488	3'659
Part de ces 10% de cas par rapport au total des prestations	56%	40%

Jours indemnisés	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre de cas avec indemnité journalière par année	109	72
Part de cas avec indemnité journalière	39%	37%
Moyenne des jours indemnisés (sans rentes)	6	5
Médiane des jours indemnisés (sans rentes)	0	0



Rentes	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre moyen de cas avec décès par année	0	0
Nombre moyen de cas avec IR par année	0	0
Part de cas avec IR	0%	0%
Degré d'invalidité moyen (tous les cas)	0.0%	-%
Degré d'invalidité moyen (cas avec IR)	13%	-%
Somme des degrés d'invalidité par année	3%	-%
Cas avec indemnités pour atteinte à l'intégrité	0%	0%

Extrapolation sur la base d'un échantillon de 73 cas reconnus LAA avec diagnostic(s) S234_ en 2011-2015, dont 49 avec ce(s) diagnostic(s) comme diagnostic principal

(1) Pour les cas avec plusieurs diagnostics traumatiques, le diagnostic traumatique principal est celui dont les frais de traitement sont les plus élevés par rapport à la moyenne de tous les cas présentant ledit diagnostic.

entorse et foulure des côtes et du sternum

Filtre: Cas acceptés avec diagnostic traumatique principal S234_



(2) pour tous les cas avec diagnostic traumatique principal