

## autres lésions traumatiques du poumon

### Filtre: Cas acceptés avec diagnostic S27.3X

X représente un chiffre quelconque, y compris toutes les sous-catégories du code diagnostic S273.

Nombre de cas par année	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Extrapolation du nombre de cas par année	614	383
dont cas avec diagnostic isolé	25	25

Socio-démographie	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Age moyen	39.7	40.5
Age médian	39.5	40.9
Proportion des accidents professionnels	23%	25%
part des femmes	18%	21%

Frais de traitement (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des frais de traitement	75'017	21'560
Médiane des frais de traitement	18'589	9'780
10% des cas ont des frais de traitement inférieurs à	520	290
10% des cas ont des frais de traitement supérieurs à	197'916	53'580
Part de ces 10% de cas par rapport au total des frais	61%	54%

Total des prestations d'assurance (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des prestations	189'449	50'175
Médiane des prestations	36'910	14'945
10% des cas ont des prestations inférieures à	3'259	520
10% des cas ont des prestations supérieures à	578'699	88'015
Part de ces 10% de cas par rapport au total des prestations	69%	64%

Jours indemnisés	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre de cas avec indemnité journalière par année	540	318
Part de cas avec indemnité journalière	88%	83%
Moyenne des jours indemnisés (sans rentes)	214	101
Médiane des jours indemnisés (sans rentes)	67	37

Rentes	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre moyen de cas avec décès par année	18	5
Nombre moyen de cas avec IR par année	50	7
Part de cas avec IR	8%	2%
Degré d'invalidité moyen (tous les cas)	5.2%	0.6%
Degré d'invalidité moyen (cas avec IR)	62%	31%
Somme des degrés d'invalidité par année	3'213%	218%
Cas avec indemnités pour atteinte à l'intégrité	18%	6%



Extrapolation sur la base d'un échantillon de 792 cas reconnus LAA avec diagnostic(s) S273X en 2011-2015, dont 244 avec ce(s) diagnostic(s) comme diagnostic principal

(1) Pour les cas avec plusieurs diagnostics traumatiques, le diagnostic traumatique principal est celui dont les frais de traitement sont les plus élevés par rapport à la moyenne de tous les cas présentant ledit diagnostic.

## autres lésions traumatiques du poumon

**Filtre: Cas acceptés avec diagnostic traumatique principal S273X**

X représente un chiffre quelconque, y compris toutes les sous-catégories du code diagnostic S273.



(2) pour tous les cas avec diagnostic traumatique principal