

lésion traumatique des muscles et des tendons au niveau du thorax

Filtre: Cas acceptés avec diagnostic S29.0_

Nombre de cas par année	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Extrapolation du nombre de cas par année	631	452
dont cas avec diagnostic isolé	388	388

Socio-démographie	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Age moyen	38.0	38.1
Age médian	36.9	36.9
Proportion des accidents professionnels	36%	35%
part des femmes	24%	21%

Frais de traitement (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des frais de traitement	1'400	857
Médiane des frais de traitement	345	248
10% des cas ont des frais de traitement inférieurs à	65	65
10% des cas ont des frais de traitement supérieurs à	2'299	1'633
Part de ces 10% de cas par rapport au total des frais	70%	63%

Total des prestations d'assurance (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des prestations	4'157	2'112
Médiane des prestations	650	536
10% des cas ont des prestations inférieures à	79	75
10% des cas ont des prestations supérieures à	6'021	4'011
Part de ces 10% de cas par rapport au total des prestations	76%	67%

Jours indemnisés	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre de cas avec indemnité journalière par année	274	160
Part de cas avec indemnité journalière	44%	35%
Moyenne des jours indemnisés (sans rentes)	15	10
Médiane des jours indemnisés (sans rentes)	0	0



Rentes	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre moyen de cas avec décès par année	0	0
Nombre moyen de cas avec IR par année	1	0
Part de cas avec IR	0%	0%
Degré d'invalidité moyen (tous les cas)	0.1%	-%
Degré d'invalidité moyen (cas avec IR)	49%	-%
Somme des degrés d'invalidité par année	30%	-%
Cas avec indemnités pour atteinte à l'intégrité	0%	0%

Extrapolation sur la base d'un échantillon de 170 cas reconnus LAA avec diagnostic(s) S290_ en 2011-2015, dont 113 avec ce(s) diagnostic(s) comme diagnostic principal

(1) Pour les cas avec plusieurs diagnostics traumatiques, le diagnostic traumatique principal est celui dont les frais de traitement sont les plus élevés par rapport à la moyenne de tous les cas présentant ledit diagnostic.

lésion traumatique des muscles et des tendons au niveau du thorax

Filtre: Cas acceptés avec diagnostic traumatique principal S290_



(2) pour tous les cas avec diagnostic traumatique principal