

Contusion des lombes et du bassin

Filtre: Cas acceptés avec diagnostic S30.0_

Nombre de cas par année	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Extrapolation du nombre de cas par année	18'232	13'158
dont cas avec diagnostic isolé	7'416	7'416

Socio-démographie	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Age moyen	39.2	39.0
Age médian	38.6	38.3
Proportion des accidents professionnels	30%	30%
part des femmes	46%	45%

Frais de traitement (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des frais de traitement	2'054	1'121
Médiane des frais de traitement	577	433
10% des cas ont des frais de traitement inférieurs à	81	66
10% des cas ont des frais de traitement supérieurs à	4'156	2'537
Part de ces 10% de cas par rapport au total des frais	63%	53%

Total des prestations d'assurance (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des prestations	5'989	3'457
Médiane des prestations	1'285	938
10% des cas ont des prestations inférieures à	127	105
10% des cas ont des prestations supérieures à	12'865	7'885
Part de ces 10% de cas par rapport au total des prestations	68%	62%

Jours indemnisés	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre de cas avec indemnité journalière par année	10'633	7'050
Part de cas avec indemnité journalière	58%	54%
Moyenne des jours indemnisés (sans rentes)	26	17
Médiane des jours indemnisés (sans rentes)	4	2



Rentes	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre moyen de cas avec décès par année	1	0
Nombre moyen de cas avec IR par année	24	2
Part de cas avec IR	0%	0%
Degré d'invalidité moyen (tous les cas)	0.0%	0.0%
Degré d'invalidité moyen (cas avec IR)	22%	18%
Somme des degrés d'invalidité par année	548%	40%
Cas avec indemnités pour atteinte à l'intégrité	0%	0%

Extrapolation sur la base d'un échantillon de 4899 cas reconnus LAA avec diagnostic(s) S300_ en 2011-2015, dont 3320 avec ce(s) diagnostic(s) comme diagnostic principal

(1) Pour les cas avec plusieurs diagnostics traumatiques, le diagnostic traumatique principal est celui dont les frais de traitement sont les plus élevés par rapport à la moyenne de tous les cas présentant ledit diagnostic.

Contusion des lombes et du bassin

Filtre: Cas acceptés avec diagnostic traumatique principal S300_



(2) pour tous les cas avec diagnostic traumatique principal