

Contusion de la paroi abdominale

Filtre: Cas acceptés avec diagnostic S30.1_

Nombre de cas par année	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Extrapolation du nombre de cas par année	2'059	1'508
dont cas avec diagnostic isolé	684	684

Socio-démographie	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Age moyen	37.0	36.1
Age médian	35.7	33.3
Proportion des accidents professionnels	26%	27%
part des femmes	39%	40%

Frais de traitement (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des frais de traitement	3'863	1'170
Médiane des frais de traitement	589	423
10% des cas ont des frais de traitement inférieurs à	60	41
10% des cas ont des frais de traitement supérieurs à	6'994	2'971
Part de ces 10% de cas par rapport au total des frais	74%	51%

Total des prestations d'assurance (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des prestations	9'124	2'298
Médiane des prestations	1'106	634
10% des cas ont des prestations inférieures à	99	64
10% des cas ont des prestations supérieures à	11'604	5'051
Part de ces 10% de cas par rapport au total des prestations	81%	57%

Jours indemnisés	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre de cas avec indemnité journalière par année	1'043	612
Part de cas avec indemnité journalière	51%	41%
Moyenne des jours indemnisés (sans rentes)	25	8
Médiane des jours indemnisés (sans rentes)	1	0



Rentes	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre moyen de cas avec décès par année	0	0
Nombre moyen de cas avec IR par année	6	0
Part de cas avec IR	0%	0%
Degré d'invalidité moyen (tous les cas)	0.1%	-%
Degré d'invalidité moyen (cas avec IR)	38%	-%
Somme des degrés d'invalidité par année	260%	-%
Cas avec indemnités pour atteinte à l'intégrité	1%	0%

Extrapolation sur la base d'un échantillon de 606 cas reconnus LAA avec diagnostic(s) S301_ en 2011-2015, dont 379 avec ce(s) diagnostic(s) comme diagnostic principal

(1) Pour les cas avec plusieurs diagnostics traumatiques, le diagnostic traumatique principal est celui dont les frais de traitement sont les plus élevés par rapport à la moyenne de tous les cas présentant ledit diagnostic.

Contusion de la paroi abdominale

Filtre: Cas acceptés avec diagnostic traumatique principal S301_



(2) pour tous les cas avec diagnostic traumatique principal