

## autres lésions traumatiques superficielles de l'abdomen, des lombes et du bassin

Filtre: Cas acceptés avec diagnostic S30.8\_

Nombre de cas par année	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Extrapolation du nombre de cas par année	1'921	1'488
dont cas avec diagnostic isolé	1'276	1'276

Socio-démographie	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Age moyen	40.9	42.1
Age médian	42.4	43.5
Proportion des accidents professionnels	12%	10%
part des femmes	34%	35%

Frais de traitement (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des frais de traitement	1'366	246
Médiane des frais de traitement	172	140
10% des cas ont des frais de traitement inférieurs à	47	41
10% des cas ont des frais de traitement supérieurs à	2'074	414
Part de ces 10% de cas par rapport au total des frais	84%	48%

Total des prestations d'assurance (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des prestations	3'323	452
Médiane des prestations	175	140
10% des cas ont des prestations inférieures à	50	41
10% des cas ont des prestations supérieures à	3'036	478
Part de ces 10% de cas par rapport au total des prestations	91%	71%

Jours indemnisés	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre de cas avec indemnité journalière par année	309	68
Part de cas avec indemnité journalière	16%	5%
Moyenne des jours indemnisés (sans rentes)	8	1
Médiane des jours indemnisés (sans rentes)	0	0



Rentes	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre moyen de cas avec décès par année	0	0
Nombre moyen de cas avec IR par année	2	0
Part de cas avec IR	0%	0%
Degré d'invalidité moyen (tous les cas)	0.1%	0.0%
Degré d'invalidité moyen (cas avec IR)	50%	50%
Somme des degrés d'invalidité par année	110%	10%
Cas avec indemnités pour atteinte à l'intégrité	0%	0%

Extrapolation sur la base d'un échantillon de 505 cas reconnus LAA avec diagnostic(s) S308\_ en 2011-2015, dont 373 avec ce(s) diagnostic(s) comme diagnostic principal

(1) Pour les cas avec plusieurs diagnostics traumatiques, le diagnostic traumatique principal est celui dont les frais de traitement sont les plus élevés par rapport à la moyenne de tous les cas présentant ledit diagnostic.

## autres lésions traumatiques superficielles de l'abdomen, des lombes et du bassin

Filtre: Cas acceptés avec diagnostic traumatique principal S308\_



(2) pour tous les cas avec diagnostic traumatique principal