

lésion traumatique superficielle de l'abdomen, des lombes et du bassin

Filtre: Cas acceptés avec diagnostic S30.XX

X représente un chiffre quelconque, y compris toutes les sous-catégories du code diagnostic S30.

Nombre de cas par année	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Extrapolation du nombre de cas par année	22'628	16'693
dont cas avec diagnostic isolé	9'804	9'804

Socio-démographie	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Age moyen	39.1	38.8
Age médian	38.5	38.0
Proportion des accidents professionnels	28%	28%
part des femmes	43%	43%

Frais de traitement (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des frais de traitement	2'169	1'043
Médiane des frais de traitement	506	381
10% des cas ont des frais de traitement inférieurs à	67	57
10% des cas ont des frais de traitement supérieurs à	4'144	2'507
Part de ces 10% de cas par rapport au total des frais	67%	54%

Total des prestations d'assurance (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des prestations	6'054	3'026
Médiane des prestations	1'082	731
10% des cas ont des prestations inférieures à	94	77
10% des cas ont des prestations supérieures à	11'890	7'137
Part de ces 10% de cas par rapport au total des prestations	72%	64%

Jours indemnisés	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre de cas avec indemnité journalière par année	12'025	7'880
Part de cas avec indemnité journalière	53%	47%
Moyenne des jours indemnisés (sans rentes)	24	14
Médiane des jours indemnisés (sans rentes)	2	0

Rentes	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre moyen de cas avec décès par année	1	1
Nombre moyen de cas avec IR par année	33	2
Part de cas avec IR	0%	0%
Degré d'invalidité moyen (tous les cas)	0.0%	0.0%
Degré d'invalidité moyen (cas avec IR)	28%	21%
Somme des degrés d'invalidité par année	966%	50%
Cas avec indemnités pour atteinte à l'intégrité	0%	0%



Extrapolation sur la base d'un échantillon de 6132 cas reconnus LAA avec diagnostic(s) S30XX en 2011-2015, dont 4214 avec ce(s) diagnostic(s) comme diagnostic principal

(1) Pour les cas avec plusieurs diagnostics traumatiques, le diagnostic traumatique principal est celui dont les frais de traitement sont les plus élevés par rapport à la moyenne de tous les cas présentant ledit diagnostic.

lésion traumatique superficielle de l'abdomen, des lombes et du bassin

Filter: Cas acceptés avec diagnostic traumatique principal S30XX

X représente un chiffre quelconque, y compris toutes les sous-catégories du code diagnostic S30.



(2) pour tous les cas avec diagnostic traumatique principal