

## plaie ouverte de la paroi abdominale

Filtre: Cas acceptés avec diagnostic S31.1\_

Nombre de cas par année	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Extrapolation du nombre de cas par année	221	176
dont cas avec diagnostic isolé	140	140

Socio-démographie	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Age moyen	36.0	36.3
Age médian	35.7	35.0
Proportion des accidents professionnels	39%	43%
part des femmes	31%	36%

Frais de traitement (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des frais de traitement	4'368	689
Médiane des frais de traitement	256	201
10% des cas ont des frais de traitement inférieurs à	32	0
10% des cas ont des frais de traitement supérieurs à	5'220	2'380
Part de ces 10% de cas par rapport au total des frais	86%	65%

Total des prestations d'assurance (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des prestations	15'242	903
Médiane des prestations	256	201
10% des cas ont des prestations inférieures à	32	0
10% des cas ont des prestations supérieures à	5'842	3'096
Part de ces 10% de cas par rapport au total des prestations	95%	68%

Jours indemnisés	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre de cas avec indemnité journalière par année	44	16
Part de cas avec indemnité journalière	20%	9%
Moyenne des jours indemnisés (sans rentes)	13	2
Médiane des jours indemnisés (sans rentes)	0	0



Rentes	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre moyen de cas avec décès par année	1	0
Nombre moyen de cas avec IR par année	2	0
Part de cas avec IR	1%	0%
Degré d'invalidité moyen (tous les cas)	0.5%	-%
Degré d'invalidité moyen (cas avec IR)	69%	-%
Somme des degrés d'invalidité par année	111%	-%
Cas avec indemnités pour atteinte à l'intégrité	1%	0%

Extrapolation sur la base d'un échantillon de 80 cas reconnus LAA avec diagnostic(s) S311\_ en 2011-2015, dont 44 avec ce(s) diagnostic(s) comme diagnostic principal

(1) Pour les cas avec plusieurs diagnostics traumatiques, le diagnostic traumatique principal est celui dont les frais de traitement sont les plus élevés par rapport à la moyenne de tous les cas présentant ledit diagnostic.

## plaie ouverte de la paroi abdominale

Filtre: Cas acceptés avec diagnostic traumatique principal S311\_



(2) pour tous les cas avec diagnostic traumatique principal