

fracture d'une vertèbre lombaire

Filtre: Cas acceptés avec diagnostic S32.0X

X représente un chiffre quelconque, y compris toutes les sous-catégories du code diagnostic S320.

Nombre de cas par année	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Extrapolation du nombre de cas par année	1'642	1'077
dont cas avec diagnostic isolé	364	364

Socio-démographie	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Age moyen	42.1	43.0
Age médian	44.3	45.3
Proportion des accidents professionnels	24%	21%
part des femmes	31%	38%

Frais de traitement (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des frais de traitement	36'323	14'494
Médiane des frais de traitement	9'968	7'412
10% des cas ont des frais de traitement inférieurs à	1'476	1'085
10% des cas ont des frais de traitement supérieurs à	73'716	36'610
Part de ces 10% de cas par rapport au total des frais	61%	41%

Total des prestations d'assurance (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des prestations	89'385	37'572
Médiane des prestations	21'764	16'391
10% des cas ont des prestations inférieures à	3'065	2'792
10% des cas ont des prestations supérieures à	169'499	74'107
Part de ces 10% de cas par rapport au total des prestations	67%	52%

Jours indemnisés	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre de cas avec indemnité journalière par année	1'502	975
Part de cas avec indemnité journalière	92%	91%
Moyenne des jours indemnisés (sans rentes)	169	111
Médiane des jours indemnisés (sans rentes)	79	62

Rentes	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre moyen de cas avec décès par année	5	0
Nombre moyen de cas avec IR par année	81	24
Part de cas avec IR	5%	2%
Degré d'invalidité moyen (tous les cas)	2.1%	0.6%
Degré d'invalidité moyen (cas avec IR)	42%	26%
Somme des degrés d'invalidité par année	3'406%	619%
Cas avec indemnités pour atteinte à l'intégrité	14%	8%



Extrapolation sur la base d'un échantillon de 1539 cas reconnus LAA avec diagnostic(s) S320X en 2011-2015, dont 694 avec ce(s) diagnostic(s) comme diagnostic principal

(1) Pour les cas avec plusieurs diagnostics traumatiques, le diagnostic traumatique principal est celui dont les frais de traitement sont les plus élevés par rapport à la moyenne de tous les cas présentant ledit diagnostic.

fracture d'une vertèbre lombaire

Filtre: Cas acceptés avec diagnostic traumatique principal S320X

X représente un chiffre quelconque, y compris toutes les sous-catégories du code diagnostic S320.



(2) pour tous les cas avec diagnostic traumatique principal