

fracture du pubis

Filtre: Cas acceptés avec diagnostic S32.5X

X représente un chiffre quelconque, y compris toutes les sous-catégories du code diagnostic S325.

Nombre de cas par année	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Extrapolation du nombre de cas par année	569	200
dont cas avec diagnostic isolé	76	76

Socio-démographie	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Age moyen	46.1	50.6
Age médian	49.0	53.3
Proportion des accidents professionnels	15%	11%
part des femmes	43%	56%

Frais de traitement (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des frais de traitement	46'325	11'975
Médiane des frais de traitement	13'022	3'531
10% des cas ont des frais de traitement inférieurs à	846	563
10% des cas ont des frais de traitement supérieurs à	108'376	24'114
Part de ces 10% de cas par rapport au total des frais	56%	57%

Total des prestations d'assurance (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des prestations	103'764	28'923
Médiane des prestations	25'302	10'771
10% des cas ont des prestations inférieures à	2'982	1'172
10% des cas ont des prestations supérieures à	220'882	42'608
Part de ces 10% de cas par rapport au total des prestations	65%	61%

Jours indemnisés	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre de cas avec indemnité journalière par année	534	180
Part de cas avec indemnité journalière	94%	90%
Moyenne des jours indemnisés (sans rentes)	180	109
Médiane des jours indemnisés (sans rentes)	78	45

Rentes	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre moyen de cas avec décès par année	2	0
Nombre moyen de cas avec IR par année	28	2
Part de cas avec IR	5%	1%
Degré d'invalidité moyen (tous les cas)	2.3%	0.2%
Degré d'invalidité moyen (cas avec IR)	47%	22%
Somme des degrés d'invalidité par année	1'317%	36%
Cas avec indemnités pour atteinte à l'intégrité	12%	2%



Extrapolation sur la base d'un échantillon de 487 cas reconnus LAA avec diagnostic(s) S325X en 2011-2015, dont 71 avec ce(s) diagnostic(s) comme diagnostic principal

(1) Pour les cas avec plusieurs diagnostics traumatiques, le diagnostic traumatique principal est celui dont les frais de traitement sont les plus élevés par rapport à la moyenne de tous les cas présentant ledit diagnostic.

fracture du pubis

Filtre: Cas acceptés avec diagnostic traumatique principal S325X

X représente un chiffre quelconque, y compris toutes les sous-catégories du code diagnostic S325.



(2) pour tous les cas avec diagnostic traumatique principal