

fracture de parties autres et non précisées du rachis lombaire et du bassin

Filtre: Cas acceptés avec diagnostic S32.8X

X représente un chiffre quelconque, y compris toutes les sous-catégories du code diagnostic S328.

Nombre de cas par année	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Extrapolation du nombre de cas par année	424	231
dont cas avec diagnostic isolé	48	48

Socio-démographie	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Age moyen	45.5	45.5
Age médian	47.9	47.6
Proportion des accidents professionnels	17%	13%
part des femmes	43%	54%

Frais de traitement (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des frais de traitement	47'557	13'274
Médiane des frais de traitement	16'379	8'104
10% des cas ont des frais de traitement inférieurs à	565	185
10% des cas ont des frais de traitement supérieurs à	117'197	32'332
Part de ces 10% de cas par rapport au total des frais	57%	43%

Total des prestations d'assurance (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des prestations	111'757	27'947
Médiane des prestations	26'850	17'672
10% des cas ont des prestations inférieures à	1'258	364
10% des cas ont des prestations supérieures à	202'603	44'063
Part de ces 10% de cas par rapport au total des prestations	67%	49%

Jours indemnisés	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre de cas avec indemnité journalière par année	379	195
Part de cas avec indemnité journalière	89%	84%
Moyenne des jours indemnisés (sans rentes)	174	94
Médiane des jours indemnisés (sans rentes)	77	53

Rentes	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre moyen de cas avec décès par année	5	0
Nombre moyen de cas avec IR par année	22	3
Part de cas avec IR	5%	1%
Degré d'invalidité moyen (tous les cas)	2.6%	0.3%
Degré d'invalidité moyen (cas avec IR)	51%	26%
Somme des degrés d'invalidité par année	1'121%	67%
Cas avec indemnités pour atteinte à l'intégrité	12%	5%



Extrapolation sur la base d'un échantillon de 390 cas reconnus LAA avec diagnostic(s) S328X en 2011-2015, dont 109 avec ce(s) diagnostic(s) comme diagnostic principal

(1) Pour les cas avec plusieurs diagnostics traumatiques, le diagnostic traumatique principal est celui dont les frais de traitement sont les plus élevés par rapport à la moyenne de tous les cas présentant ledit diagnostic.

fracture de parties autres et non précisées du rachis lombaire et du bassin

Filtre: Cas acceptés avec diagnostic traumatique principal S328X

X représente un chiffre quelconque, y compris toutes les sous-catégories du code diagnostic S328.



(2) pour tous les cas avec diagnostic traumatique principal