

fracture du rachis lombaire et du bassin

Filtre: Cas acceptés avec diagnostic S32.XX

X représente un chiffre quelconque, y compris toutes les sous-catégories du code diagnostic S32.

Nombre de cas par année	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Extrapolation du nombre de cas par année	3'481	2'779
dont cas avec diagnostic isolé	992	992

Socio-démographie	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Age moyen	42.7	43.0
Age médian	44.1	44.8
Proportion des accidents professionnels	20%	19%
part des femmes	42%	46%

Frais de traitement (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des frais de traitement	28'523	12'272
Médiane des frais de traitement	6'890	4'357
10% des cas ont des frais de traitement inférieurs à	383	331
10% des cas ont des frais de traitement supérieurs à	68'697	34'917
Part de ces 10% de cas par rapport au total des frais	52%	49%

Total des prestations d'assurance (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des prestations	68'081	30'050
Médiane des prestations	15'917	12'070
10% des cas ont des prestations inférieures à	990	674
10% des cas ont des prestations supérieures à	133'120	62'637
Part de ces 10% de cas par rapport au total des prestations	62%	56%

Jours indemnisés	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre de cas avec indemnité journalière par année	2'988	2'335
Part de cas avec indemnité journalière	86%	84%
Moyenne des jours indemnisés (sans rentes)	133	90
Médiane des jours indemnisés (sans rentes)	57	45

Rentes	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre moyen de cas avec décès par année	14	1
Nombre moyen de cas avec IR par année	120	42
Part de cas avec IR	3%	2%
Degré d'invalidité moyen (tous les cas)	1.5%	0.4%
Degré d'invalidité moyen (cas avec IR)	42%	25%
Somme des degrés d'invalidité par année	5'069%	1'068%
Cas avec indemnités pour atteinte à l'intégrité	10%	5%



Extrapolation sur la base d'un échantillon de 2565 cas reconnus LAA avec diagnostic(s) S32XX en 2011-2015, dont 1449 avec ce(s) diagnostic(s) comme diagnostic principal

(1) Pour les cas avec plusieurs diagnostics traumatiques, le diagnostic traumatique principal est celui dont les frais de traitement sont les plus élevés par rapport à la moyenne de tous les cas présentant ledit diagnostic.

fracture du rachis lombaire et du bassin

Filtre: Cas acceptés avec diagnostic traumatique principal S32XX

X représente un chiffre quelconque, y compris toutes les sous-catégories du code diagnostic S32.



(2) pour tous les cas avec diagnostic traumatique principal