

## rupture traumatique d'un disque intervertébral lombaire

Filtre: Cas acceptés avec diagnostic S33.0\_

Nombre de cas par année	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Extrapolation du nombre de cas par année	112	104
dont cas avec diagnostic isolé	8	8

Socio-démographie	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Age moyen	39.3	39.3
Age médian	38.7	38.7
Proportion des accidents professionnels	43%	45%
part des femmes	26%	27%

Frais de traitement (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des frais de traitement	17'379	13'315
Médiane des frais de traitement	5'419	7'119
10% des cas ont des frais de traitement inférieurs à	1'198	1'198
10% des cas ont des frais de traitement supérieurs à	28'246	28'246
Part de ces 10% de cas par rapport au total des frais	57%	47%

Total des prestations d'assurance (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des prestations	47'671	37'178
Médiane des prestations	20'733	24'913
10% des cas ont des prestations inférieures à	2'132	2'132
10% des cas ont des prestations supérieures à	60'390	60'390
Part de ces 10% de cas par rapport au total des prestations	60%	50%

Jours indemnisés	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre de cas avec indemnité journalière par année	104	96
Part de cas avec indemnité journalière	93%	92%
Moyenne des jours indemnisés (sans rentes)	145	128
Médiane des jours indemnisés (sans rentes)	76	72



Rentes	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre moyen de cas avec décès par année	0	0
Nombre moyen de cas avec IR par année	3	2
Part de cas avec IR	3%	2%
Degré d'invalidité moyen (tous les cas)	0.8%	0.4%
Degré d'invalidité moyen (cas avec IR)	29%	27%
Somme des degrés d'invalidité par année	87%	43%
Cas avec indemnités pour atteinte à l'intégrité	7%	4%

Extrapolation sur la base d'un échantillon de 66 cas reconnus LAA avec diagnostic(s) S330\_ en 2011-2015, dont 46 avec ce(s) diagnostic(s) comme diagnostic principal

(1) Pour les cas avec plusieurs diagnostics traumatiques, le diagnostic traumatique principal est celui dont les frais de traitement sont les plus élevés par rapport à la moyenne de tous les cas présentant ledit diagnostic.

## rupture traumatique d'un disque intervertébral lombaire

Filtre: Cas acceptés avec diagnostic traumatique principal S330\_



(2) pour tous les cas avec diagnostic traumatique principal