

## luxation des articulations sacro-iliaque et sacro-coccygienne

Filtre: Cas acceptés avec diagnostic S33.2\_

Nombre de cas par année	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Extrapolation du nombre de cas par année	61	49
dont cas avec diagnostic isolé	12	12

Socio-démographie	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Age moyen	42.9	42.5
Age médian	39.4	37.7
Proportion des accidents professionnels	20%	20%
part des femmes	36%	43%

Frais de traitement (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des frais de traitement	73'330	33'808
Médiane des frais de traitement	3'049	2'414
10% des cas ont des frais de traitement inférieurs à	0	0
10% des cas ont des frais de traitement supérieurs à	179'537	95'512
Part de ces 10% de cas par rapport au total des frais	63%	56%

Total des prestations d'assurance (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des prestations	198'935	82'089
Médiane des prestations	32'898	12'099
10% des cas ont des prestations inférieures à	1'324	1'324
10% des cas ont des prestations supérieures à	573'441	154'335
Part de ces 10% de cas par rapport au total des prestations	72%	63%

Jours indemnisés	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre de cas avec indemnité journalière par année	52	41
Part de cas avec indemnité journalière	85%	83%
Moyenne des jours indemnisés (sans rentes)	218	153
Médiane des jours indemnisés (sans rentes)	69	69



Rentes	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre moyen de cas avec décès par année	1	0
Nombre moyen de cas avec IR par année	7	2
Part de cas avec IR	11%	5%
Degré d'invalidité moyen (tous les cas)	5.7%	1.4%
Degré d'invalidité moyen (cas avec IR)	51%	28%
Somme des degrés d'invalidité par année	349%	67%
Cas avec indemnités pour atteinte à l'intégrité	19%	10%

Extrapolation sur la base d'un échantillon de 79 cas reconnus LAA avec diagnostic(s) S332\_ en 2011-2015, dont 38 avec ce(s) diagnostic(s) comme diagnostic principal

(1) Pour les cas avec plusieurs diagnostics traumatiques, le diagnostic traumatique principal est celui dont les frais de traitement sont les plus élevés par rapport à la moyenne de tous les cas présentant ledit diagnostic.

## luxation des articulations sacro-iliaque et sacro-coccygienne

Filtre: Cas acceptés avec diagnostic traumatique principal S332\_



(2) pour tous les cas avec diagnostic traumatique principal