

rupture traumatique de la symphyse pubienne

Filtre: Cas acceptés avec diagnostic S33.4_

Nombre de cas par année	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Extrapolation du nombre de cas par année	81	55
dont cas avec diagnostic isolé	4	4

Socio-démographie	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Age moyen	43.4	42.9
Age médian	45.1	38.9
Proportion des accidents professionnels	23%	19%
part des femmes	30%	39%

Frais de traitement (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des frais de traitement	77'852	33'906
Médiane des frais de traitement	33'708	16'136
10% des cas ont des frais de traitement inférieurs à	1'513	1'436
10% des cas ont des frais de traitement supérieurs à	179'952	63'641
Part de ces 10% de cas par rapport au total des frais	54%	46%

Total des prestations d'assurance (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des prestations	193'760	82'938
Médiane des prestations	55'402	33'336
10% des cas ont des prestations inférieures à	6'780	4'775
10% des cas ont des prestations supérieures à	573'441	169'095
Part de ces 10% de cas par rapport au total des prestations	62%	56%

Jours indemnisés	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre de cas avec indemnité journalière par année	76	51
Part de cas avec indemnité journalière	94%	92%
Moyenne des jours indemnisés (sans rentes)	249	166
Médiane des jours indemnisés (sans rentes)	114	80



Rentes	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre moyen de cas avec décès par année	1	0
Nombre moyen de cas avec IR par année	10	3
Part de cas avec IR	12%	6%
Degré d'invalidité moyen (tous les cas)	5.4%	1.5%
Degré d'invalidité moyen (cas avec IR)	44%	27%
Somme des degrés d'invalidité par année	437%	85%
Cas avec indemnités pour atteinte à l'intégrité	24%	12%

Extrapolation sur la base d'un échantillon de 118 cas reconnus LAA avec diagnostic(s) S334_ en 2011-2015, dont 49 avec ce(s) diagnostic(s) comme diagnostic principal

(1) Pour les cas avec plusieurs diagnostics traumatiques, le diagnostic traumatique principal est celui dont les frais de traitement sont les plus élevés par rapport à la moyenne de tous les cas présentant ledit diagnostic.

rupture traumatique de la symphyse pubienne

Filtre: Cas acceptés avec diagnostic traumatique principal S334_



(2) pour tous les cas avec diagnostic traumatique principal