

entorse et foulure du rachis lombaire

filtre: Cas acceptés avec diagnostic S33.5

Nombre de cas par année	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Extrapolation du nombre de cas par année	2'561	2'038
dont cas avec diagnostic isolé	660	660

Socio-démographie	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Age moyen	39.6	40.0
Age médian	38.8	39.0
Proportion des accidents professionnels	40%	43%
part des femmes	32%	28%

Frais de traitement (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des frais de traitement	1'911	1'247
Médiane des frais de traitement	704	572
10% des cas ont des frais de traitement inférieurs à	74	50
10% des cas ont des frais de traitement supérieurs à	3'649	2'642
Part de ces 10% de cas par rapport au total des frais	60%	52%

Total des prestations d'assurance (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des prestations	6'129	4'370
Médiane des prestations	1'532	1'159
10% des cas ont des prestations inférieures à	187	154
10% des cas ont des prestations supérieures à	13'906	10'546
Part de ces 10% de cas par rapport au total des prestations	65%	63%

Jours indemnisés	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre de cas avec indemnité journalière par année	1'513	1'146
Part de cas avec indemnité journalière	59%	56%
Moyenne des jours indemnisés (sans rentes)	26	20
Médiane des jours indemnisés (sans rentes)	5	3



Rentes	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre moyen de cas avec décès par année	0	0
Nombre moyen de cas avec IR par année	4	2
Part de cas avec IR	0%	0%
Degré d'invalidité moyen (tous les cas)	0.0%	0.0%
Degré d'invalidité moyen (cas avec IR)	27%	21%
Somme des degrés d'invalidité par année	101%	39%
Cas avec indemnités pour atteinte à l'intégrité	0%	0%

Extrapolation sur la base d'un échantillon de 683 cas reconnus LAA avec diagnostic(s) S335_ en 2011-2015, dont 521 avec ce(s) diagnostic(s) comme diagnostic principal

(1) Pour les cas avec plusieurs diagnostics traumatiques, le diagnostic traumatique principal est celui dont les frais de traitement sont les plus élevés par rapport à la moyenne de tous les cas présentant ledit diagnostic.

entorse et foulure du rachis lombaire

Filtre: Cas acceptés avec diagnostic traumatique principal S335_



(2) pour tous les cas avec diagnostic traumatique principal