

## entorse et foulure de parties autres et non précisées du rachis lombaire et du bassin

Filtre: Cas acceptés avec diagnostic S33.7\_

Nombre de cas par année	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Extrapolation du nombre de cas par année	1'200	860
dont cas avec diagnostic isolé	564	564

Socio-démographie	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Age moyen	38.6	38.4
Age médian	37.6	37.3
Proportion des accidents professionnels	29%	33%
part des femmes	36%	30%

Frais de traitement (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des frais de traitement	1'593	952
Médiane des frais de traitement	459	394
10% des cas ont des frais de traitement inférieurs à	57	57
10% des cas ont des frais de traitement supérieurs à	2'565	1'769
Part de ces 10% de cas par rapport au total des frais	65%	54%

Total des prestations d'assurance (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des prestations	4'143	2'366
Médiane des prestations	882	554
10% des cas ont des prestations inférieures à	92	72
10% des cas ont des prestations supérieures à	7'189	4'932
Part de ces 10% de cas par rapport au total des prestations	72%	66%

Jours indemnisés	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre de cas avec indemnité journalière par année	500	320
Part de cas avec indemnité journalière	42%	37%
Moyenne des jours indemnisés (sans rentes)	14	7
Médiane des jours indemnisés (sans rentes)	0	0



Rentes	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre moyen de cas avec décès par année	0	0
Nombre moyen de cas avec IR par année	2	0
Part de cas avec IR	0%	0%
Degré d'invalidité moyen (tous les cas)	0.1%	0.0%
Degré d'invalidité moyen (cas avec IR)	27%	37%
Somme des degrés d'invalidité par année	59%	15%
Cas avec indemnités pour atteinte à l'intégrité	0%	0%

Extrapolation sur la base d'un échantillon de 321 cas reconnus LAA avec diagnostic(s) S337\_ en 2011-2015, dont 217 avec ce(s) diagnostic(s) comme diagnostic principal

(1) Pour les cas avec plusieurs diagnostics traumatiques, le diagnostic traumatique principal est celui dont les frais de traitement sont les plus élevés par rapport à la moyenne de tous les cas présentant ledit diagnostic.

## entorse et foulure de parties autres et non précisées du rachis lombaire et du bassin

Filtre: Cas acceptés avec diagnostic traumatique principal S337\_



(2) pour tous les cas avec diagnostic traumatique principal