

autres lésions traumatiques de la moelle lombaire

Filtre: Cas acceptés avec diagnostic S34.1_

Nombre de cas par année	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Extrapolation du nombre de cas par année	15	12
dont cas avec diagnostic isolé	0	0

Socio-démographie	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Age moyen	36.5	36.9
Age médian	38.0	38.0
Proportion des accidents professionnels	40%	45%
part des femmes	19%	16%

Frais de traitement (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des frais de traitement	393'967	380'066
Médiane des frais de traitement	414'637	405'614
10% des cas ont des frais de traitement inférieurs à	146'591	187'825
10% des cas ont des frais de traitement supérieurs à	539'490	533'318
Part de ces 10% de cas par rapport au total des frais	17%	16%

Total des prestations d'assurance (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des prestations	942'161	922'684
Médiane des prestations	750'444	750'444
10% des cas ont des prestations inférieures à	307'759	307'759
10% des cas ont des prestations supérieures à	1'923'363	1'847'594
Part de ces 10% de cas par rapport au total des prestations	26%	28%

Jours indemnisés	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre de cas avec indemnité journalière par année	14	12
Part de cas avec indemnité journalière	96%	97%
Moyenne des jours indemnisés (sans rentes)	887	907
Médiane des jours indemnisés (sans rentes)	828	844



Rentes	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre moyen de cas avec décès par année	0	0
Nombre moyen de cas avec IR par année	6	5
Part de cas avec IR	43%	40%
Degré d'invalidité moyen (tous les cas)	22.5%	18.9%
Degré d'invalidité moyen (cas avec IR)	54%	49%
Somme des degrés d'invalidité par année	337%	234%
Cas avec indemnités pour atteinte à l'intégrité	69%	63%

Extrapolation sur la base d'un échantillon de 56 cas reconnus LAA avec diagnostic(s) S341_ en 2011-2015, dont 43 avec ce(s) diagnostic(s) comme diagnostic principal

(1) Pour les cas avec plusieurs diagnostics traumatiques, le diagnostic traumatique principal est celui dont les frais de traitement sont les plus élevés par rapport à la moyenne de tous les cas présentant ledit diagnostic.

autres lésions traumatiques de la moelle lombaire

Filtre: Cas acceptés avec diagnostic traumatique principal S341_



(2) pour tous les cas avec diagnostic traumatique principal