

lésion traumatique des nerfs et de la moelle épinière lombaire au niveau de l'abdomen, des lombes et du bassin

Filtre: Cas acceptés avec diagnostic S34.XX

X représente un chiffre quelconque, y compris toutes les sous-catégories du code diagnostic S34.

Nombre de cas par année	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Extrapolation du nombre de cas par année	126	110
dont cas avec diagnostic isolé	24	24

Socio-démographie	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Age moyen	42.9	42.7
Age médian	40.5	40.4
Proportion des accidents professionnels	32%	34%
part des femmes	30%	29%

Frais de traitement (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des frais de traitement	88'472	66'132
Médiane des frais de traitement	2'400	1'660
10% des cas ont des frais de traitement inférieurs à	100	97
10% des cas ont des frais de traitement supérieurs à	340'052	273'067
Part de ces 10% de cas par rapport au total des frais	60%	71%

Total des prestations d'assurance (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des prestations	222'271	169'161
Médiane des prestations	5'394	3'301
10% des cas ont des prestations inférieures à	115	115
10% des cas ont des prestations supérieures à	750'444	742'265
Part de ces 10% de cas par rapport au total des prestations	64%	74%

Jours indemnisés	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre de cas avec indemnité journalière par année	85	70
Part de cas avec indemnité journalière	68%	63%
Moyenne des jours indemnisés (sans rentes)	254	207
Médiane des jours indemnisés (sans rentes)	25	15

Rentes	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre moyen de cas avec décès par année	0	0
Nombre moyen de cas avec IR par année	15	10
Part de cas avec IR	12%	9%
Degré d'invalidité moyen (tous les cas)	6.1%	4.3%
Degré d'invalidité moyen (cas avec IR)	52%	48%
Somme des degrés d'invalidité par année	772%	473%
Cas avec indemnités pour atteinte à l'intégrité	23%	16%



Extrapolation sur la base d'un échantillon de 174 cas reconnus LAA avec diagnostic(s) S34XX en 2011-2015, dont 115 avec ce(s) diagnostic(s) comme diagnostic principal

(1) Pour les cas avec plusieurs diagnostics traumatiques, le diagnostic traumatique principal est celui dont les frais de traitement sont les plus élevés par rapport à la moyenne de tous les cas présentant ledit diagnostic.

lésion traumatique des nerfs et de la moelle épinière lombaire au niveau de l'abdomen, des lombes et du bassin

Filter: Cas acceptés avec diagnostic traumatique principal S34XX

X représente un chiffre quelconque, y compris toutes les sous-catégories du code diagnostic S34.



(2) pour tous les cas avec diagnostic traumatique principal