

lésion traumatique du foie et de la vésicule biliaire

Filter: Cas acceptés avec diagnostic S36.1_

Nombre de cas par année	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Extrapolation du nombre de cas par année	259	149
dont cas avec diagnostic isolé	24	24

Socio-démographie	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Age moyen	37.4	37.3
Age médian	37.8	36.6
Proportion des accidents professionnels	16%	12%
part des femmes	42%	50%

Frais de traitement (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des frais de traitement	60'202	32'385
Médiane des frais de traitement	18'876	11'666
10% des cas ont des frais de traitement inférieurs à	1'152	727
10% des cas ont des frais de traitement supérieurs à	157'443	101'912
Part de ces 10% de cas par rapport au total des frais	52%	45%

Total des prestations d'assurance (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des prestations	145'379	63'826
Médiane des prestations	29'745	15'668
10% des cas ont des prestations inférieures à	1'733	727
10% des cas ont des prestations supérieures à	312'242	189'116
Part de ces 10% de cas par rapport au total des prestations	65%	55%

Jours indemnisés	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre de cas avec indemnité journalière par année	219	120
Part de cas avec indemnité journalière	85%	80%
Moyenne des jours indemnisés (sans rentes)	183	131
Médiane des jours indemnisés (sans rentes)	48	29



Rentes	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre moyen de cas avec décès par année	8	1
Nombre moyen de cas avec IR par année	14	2
Part de cas avec IR	5%	1%
Degré d'invalidité moyen (tous les cas)	3.3%	0.5%
Degré d'invalidité moyen (cas avec IR)	59%	43%
Somme des degrés d'invalidité par année	850%	77%
Cas avec indemnités pour atteinte à l'intégrité	13%	5%

Extrapolation sur la base d'un échantillon de 267 cas reconnus LAA avec diagnostic(s) S361_ en 2011-2015, dont 82 avec ce(s) diagnostic(s) comme diagnostic principal

(1) Pour les cas avec plusieurs diagnostics traumatiques, le diagnostic traumatique principal est celui dont les frais de traitement sont les plus élevés par rapport à la moyenne de tous les cas présentant ledit diagnostic.

lésion traumatique du foie et de la vésicule biliaire

Filtre: Cas acceptés avec diagnostic traumatique principal S361_



(2) pour tous les cas avec diagnostic traumatique principal