

lésion traumatique de l'abdomen, des lombes et du bassin, sans précision

Filtre: Cas acceptés avec diagnostic S39.9_

Nombre de cas par année	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Extrapolation du nombre de cas par année	1'637	1'400
dont cas avec diagnostic isolé	780	780

Socio-démographie	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Age moyen	37.4	37.5
Age médian	35.8	36.1
Proportion des accidents professionnels	30%	31%
part des femmes	42%	42%

Frais de traitement (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des frais de traitement	2'199	753
Médiane des frais de traitement	410	359
10% des cas ont des frais de traitement inférieurs à	0	0
10% des cas ont des frais de traitement supérieurs à	2'697	1'887
Part de ces 10% de cas par rapport au total des frais	78%	50%

Total des prestations d'assurance (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des prestations	5'572	1'339
Médiane des prestations	612	545
10% des cas ont des prestations inférieures à	50	29
10% des cas ont des prestations supérieures à	5'076	3'274
Part de ces 10% de cas par rapport au total des prestations	85%	53%

Jours indemnisés	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre de cas avec indemnité journalière par année	575	448
Part de cas avec indemnité journalière	35%	32%
Moyenne des jours indemnisés (sans rentes)	12	5
Médiane des jours indemnisés (sans rentes)	0	0



Rentes	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre moyen de cas avec décès par année	1	0
Nombre moyen de cas avec IR par année	2	0
Part de cas avec IR	0%	0%
Degré d'invalidité moyen (tous les cas)	0.1%	-%
Degré d'invalidité moyen (cas avec IR)	60%	-%
Somme des degrés d'invalidité par année	145%	-%
Cas avec indemnités pour atteinte à l'intégrité	0%	0%

Extrapolation sur la base d'un échantillon de 452 cas reconnus LAA avec diagnostic(s) S399_ en 2011-2015, dont 351 avec ce(s) diagnostic(s) comme diagnostic principal

(1) Pour les cas avec plusieurs diagnostics traumatiques, le diagnostic traumatique principal est celui dont les frais de traitement sont les plus élevés par rapport à la moyenne de tous les cas présentant ledit diagnostic.

lésion traumatique de l'abdomen, des lombes et du bassin, sans précision

Filtre: Cas acceptés avec diagnostic traumatique principal S399_



(2) pour tous les cas avec diagnostic traumatique principal