

Contusion de l'épaule et du bras

Filtre: Cas acceptés avec diagnostic S40.0_

Nombre de cas par année	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Extrapolation du nombre de cas par année	26'454	20'146
dont cas avec diagnostic isolé	10'029	10'029

Socio-démographie	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Age moyen	40.6	39.8
Age médian	41.5	40.3
Proportion des accidents professionnels	25%	25%
part des femmes	36%	37%

Frais de traitement (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des frais de traitement	2'651	1'197
Médiane des frais de traitement	657	469
10% des cas ont des frais de traitement inférieurs à	99	76
10% des cas ont des frais de traitement supérieurs à	5'312	2'390
Part de ces 10% de cas par rapport au total des frais	67%	55%

Total des prestations d'assurance (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des prestations	7'782	2'817
Médiane des prestations	1'148	780
10% des cas ont des prestations inférieures à	135	107
10% des cas ont des prestations supérieures à	14'150	5'700
Part de ces 10% de cas par rapport au total des prestations	77%	65%

Jours indemnisés	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre de cas avec indemnité journalière par année	12'362	8'048
Part de cas avec indemnité journalière	47%	40%
Moyenne des jours indemnisés (sans rentes)	28	12
Médiane des jours indemnisés (sans rentes)	0	0



Rentes	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre moyen de cas avec décès par année	1	1
Nombre moyen de cas avec IR par année	115	5
Part de cas avec IR	0%	0%
Degré d'invalidité moyen (tous les cas)	0.1%	0.0%
Degré d'invalidité moyen (cas avec IR)	21%	15%
Somme des degrés d'invalidité par année	2'448%	82%
Cas avec indemnités pour atteinte à l'intégrité	1%	0%

Extrapolation sur la base d'un échantillon de 7895 cas reconnus LAA avec diagnostic(s) S400_ en 2011-2015, dont 5102 avec ce(s) diagnostic(s) comme diagnostic principal

(1) Pour les cas avec plusieurs diagnostics traumatiques, le diagnostic traumatique principal est celui dont les frais de traitement sont les plus élevés par rapport à la moyenne de tous les cas présentant ledit diagnostic.

Contusion de l'épaule et du bras

Filtre: Cas acceptés avec diagnostic traumatique principal S400_



(2) pour tous les cas avec diagnostic traumatique principal