

## fracture fermée de l'extrémité supérieure de l'humérus, fracture du trochiter

Filtre: Cas acceptés avec diagnostic S42.20

Nombre de cas par année	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Extrapolation du nombre de cas par année	3'542	2'988
dont cas avec diagnostic isolé	1'269	1'269

Socio-démographie	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Age moyen	46.0	46.0
Age médian	47.7	47.9
Proportion des accidents professionnels	13%	12%
part des femmes	37%	40%

Frais de traitement (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des frais de traitement	13'002	9'692
Médiane des frais de traitement	4'997	4'213
10% des cas ont des frais de traitement inférieurs à	1'538	1'411
10% des cas ont des frais de traitement supérieurs à	26'205	21'429
Part de ces 10% de cas par rapport au total des frais	48%	40%

Total des prestations d'assurance (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des prestations	33'094	24'023
Médiane des prestations	14'666	12'870
10% des cas ont des prestations inférieures à	2'481	2'207
10% des cas ont des prestations supérieures à	59'575	47'306
Part de ces 10% de cas par rapport au total des prestations	55%	46%

Jours indemnisés	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre de cas avec indemnité journalière par année	2'976	2'475
Part de cas avec indemnité journalière	84%	83%
Moyenne des jours indemnisés (sans rentes)	98	82
Médiane des jours indemnisés (sans rentes)	54	49



Rentes	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre moyen de cas avec décès par année	1	0
Nombre moyen de cas avec IR par année	49	24
Part de cas avec IR	1%	1%
Degré d'invalidité moyen (tous les cas)	0.4%	0.2%
Degré d'invalidité moyen (cas avec IR)	27%	21%
Somme des degrés d'invalidité par année	1'325%	501%
Cas avec indemnités pour atteinte à l'intégrité	5%	3%

Extrapolation sur la base d'un échantillon de 1790 cas reconnus LAA avec diagnostic(s) S4220 en 2011-2015, dont 1258 avec ce(s) diagnostic(s) comme diagnostic principal

(1) Pour les cas avec plusieurs diagnostics traumatiques, le diagnostic traumatique principal est celui dont les frais de traitement sont les plus élevés par rapport à la moyenne de tous les cas présentant ledit diagnostic.

## fracture fermée de l'extrémité supérieure de l'humérus, fracture du trochiter

Filtre: Cas acceptés avec diagnostic traumatique principal S4220



(2) pour tous les cas avec diagnostic traumatique principal