

Luxation de l'articulation de l'épaule [articulation gléno-humérale]

Filtre: Cas acceptés avec diagnostic S43.0_

Nombre de cas par année	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Extrapolation du nombre de cas par année	5'262	3'400
dont cas avec diagnostic isolé	2'268	2'268

Socio-démographie	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Age moyen	37.1	34.4
Age médian	34.3	30.9
Proportion des accidents professionnels	18%	19%
part des femmes	17%	16%

Frais de traitement (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des frais de traitement	6'929	3'186
Médiane des frais de traitement	2'429	1'490
10% des cas ont des frais de traitement inférieurs à	314	149
10% des cas ont des frais de traitement supérieurs à	16'139	10'139
Part de ces 10% de cas par rapport au total des frais	51%	49%

Total des prestations d'assurance (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des prestations	18'655	7'623
Médiane des prestations	4'906	2'850
10% des cas ont des prestations inférieures à	559	347
10% des cas ont des prestations supérieures à	39'082	20'260
Part de ces 10% de cas par rapport au total des prestations	61%	54%

Jours indemnisés	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre de cas avec indemnité journalière par année	3'722	2'172
Part de cas avec indemnité journalière	71%	64%
Moyenne des jours indemnisés (sans rentes)	63	29
Médiane des jours indemnisés (sans rentes)	18	8



Rentes	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre moyen de cas avec décès par année	1	0
Nombre moyen de cas avec IR par année	42	4
Part de cas avec IR	1%	0%
Degré d'invalidité moyen (tous les cas)	0.2%	0.0%
Degré d'invalidité moyen (cas avec IR)	23%	19%
Somme des degrés d'invalidité par année	992%	85%
Cas avec indemnités pour atteinte à l'intégrité	2%	0%

Extrapolation sur la base d'un échantillon de 1950 cas reconnus LAA avec diagnostic(s) S430_ en 2011-2015, dont 908 avec ce(s) diagnostic(s) comme diagnostic principal

(1) Pour les cas avec plusieurs diagnostics traumatiques, le diagnostic traumatique principal est celui dont les frais de traitement sont les plus élevés par rapport à la moyenne de tous les cas présentant ledit diagnostic.

Luxation de l'articulation de l'épaule [articulation gléno-humérale]

Filtre: Cas acceptés avec diagnostic traumatique principal S430_



(2) pour tous les cas avec diagnostic traumatique principal