

luxation de l'articulation acromio-claviculaire

Filtre: Cas acceptés avec diagnostic S43.1_

Nombre de cas par année	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Extrapolation du nombre de cas par année	1'862	1'519
dont cas avec diagnostic isolé	888	888

Socio-démographie	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Age moyen	37.9	36.6
Age médian	36.3	34.8
Proportion des accidents professionnels	10%	11%
part des femmes	12%	10%

Frais de traitement (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des frais de traitement	7'031	4'307
Médiane des frais de traitement	1'989	1'458
10% des cas ont des frais de traitement inférieurs à	406	325
10% des cas ont des frais de traitement supérieurs à	15'270	12'568
Part de ces 10% de cas par rapport au total des frais	51%	41%

Total des prestations d'assurance (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des prestations	19'897	11'133
Médiane des prestations	5'983	4'580
10% des cas ont des prestations inférieures à	667	620
10% des cas ont des prestations supérieures à	35'100	27'220
Part de ces 10% de cas par rapport au total des prestations	61%	47%

Jours indemnisés	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre de cas avec indemnité journalière par année	1'445	1'158
Part de cas avec indemnité journalière	78%	76%
Moyenne des jours indemnisés (sans rentes)	60	42
Médiane des jours indemnisés (sans rentes)	23	19



Rentes	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre moyen de cas avec décès par année	1	0
Nombre moyen de cas avec IR par année	15	3
Part de cas avec IR	1%	0%
Degré d'invalidité moyen (tous les cas)	0.2%	0.0%
Degré d'invalidité moyen (cas avec IR)	28%	18%
Somme des degrés d'invalidité par année	448%	46%
Cas avec indemnités pour atteinte à l'intégrité	3%	1%

Extrapolation sur la base d'un échantillon de 702 cas reconnus LAA avec diagnostic(s) S431_ en 2011-2015, dont 449 avec ce(s) diagnostic(s) comme diagnostic principal

(1) Pour les cas avec plusieurs diagnostics traumatiques, le diagnostic traumatique principal est celui dont les frais de traitement sont les plus élevés par rapport à la moyenne de tous les cas présentant ledit diagnostic.

luxation de l'articulation acromio-claviculaire

Filtre: Cas acceptés avec diagnostic traumatique principal S431_



(2) pour tous les cas avec diagnostic traumatique principal