

entorse et foulure de l'articulation de l'épaule

Filtre: Cas acceptés avec diagnostic S43.4_

Nombre de cas par année	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Extrapolation du nombre de cas par année	7'671	6'117
dont cas avec diagnostic isolé	3'780	3'780

Socio-démographie	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Age moyen	40.3	39.7
Age médian	41.0	39.9
Proportion des accidents professionnels	29%	30%
part des femmes	29%	30%

Frais de traitement (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des frais de traitement	2'474	1'348
Médiane des frais de traitement	764	554
10% des cas ont des frais de traitement inférieurs à	91	75
10% des cas ont des frais de traitement supérieurs à	5'117	2'726
Part de ces 10% de cas par rapport au total des frais	64%	53%

Total des prestations d'assurance (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des prestations	7'100	2'992
Médiane des prestations	1'199	923
10% des cas ont des prestations inférieures à	122	99
10% des cas ont des prestations supérieures à	14'658	5'845
Part de ces 10% de cas par rapport au total des prestations	75%	65%

Jours indemnisés	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre de cas avec indemnité journalière par année	3'265	2'184
Part de cas avec indemnité journalière	43%	36%
Moyenne des jours indemnisés (sans rentes)	26	12
Médiane des jours indemnisés (sans rentes)	0	0



Rentes	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre moyen de cas avec décès par année	0	0
Nombre moyen de cas avec IR par année	33	3
Part de cas avec IR	0%	0%
Degré d'invalidité moyen (tous les cas)	0.1%	0.0%
Degré d'invalidité moyen (cas avec IR)	19%	16%
Somme des degrés d'invalidité par année	622%	45%
Cas avec indemnités pour atteinte à l'intégrité	1%	0%

Extrapolation sur la base d'un échantillon de 2274 cas reconnus LAA avec diagnostic(s) S434_ en 2011-2015, dont 1570 avec ce(s) diagnostic(s) comme diagnostic principal

(1) Pour les cas avec plusieurs diagnostics traumatiques, le diagnostic traumatique principal est celui dont les frais de traitement sont les plus élevés par rapport à la moyenne de tous les cas présentant ledit diagnostic.

entorse et foulure de l'articulation de l'épaule

Filtre: Cas acceptés avec diagnostic traumatique principal S434_



(2) pour tous les cas avec diagnostic traumatique principal