

entorse et foulure de l'articulation acromio-claviculaire

Filter: Cas acceptés avec diagnostic S43.5_

Nombre de cas par année	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Extrapolation du nombre de cas par année	1'360	963
dont cas avec diagnostic isolé	524	524

Socio-démographie	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Age moyen	36.5	35.2
Age médian	34.7	33.0
Proportion des accidents professionnels	20%	20%
part des femmes	18%	20%

Frais de traitement (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des frais de traitement	2'991	1'513
Médiane des frais de traitement	1'203	888
10% des cas ont des frais de traitement inférieurs à	294	232
10% des cas ont des frais de traitement supérieurs à	6'000	3'112
Part de ces 10% de cas par rapport au total des frais	57%	42%

Total des prestations d'assurance (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des prestations	9'039	4'097
Médiane des prestations	2'660	1'797
10% des cas ont des prestations inférieures à	478	338
10% des cas ont des prestations supérieures à	17'022	8'876
Part de ces 10% de cas par rapport au total des prestations	64%	50%

Jours indemnisés	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre de cas avec indemnité journalière par année	848	554
Part de cas avec indemnité journalière	62%	58%
Moyenne des jours indemnisés (sans rentes)	34	18
Médiane des jours indemnisés (sans rentes)	8	4



Rentes	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre moyen de cas avec décès par année	0	0
Nombre moyen de cas avec IR par année	6	0
Part de cas avec IR	0%	0%
Degré d'invalidité moyen (tous les cas)	0.1%	0.0%
Degré d'invalidité moyen (cas avec IR)	20%	11%
Somme des degrés d'invalidité par année	116%	3%
Cas avec indemnités pour atteinte à l'intégrité	1%	0%

Extrapolation sur la base d'un échantillon de 417 cas reconnus LAA avec diagnostic(s) S435_ en 2011-2015, dont 253 avec ce(s) diagnostic(s) comme diagnostic principal

(1) Pour les cas avec plusieurs diagnostics traumatiques, le diagnostic traumatique principal est celui dont les frais de traitement sont les plus élevés par rapport à la moyenne de tous les cas présentant ledit diagnostic.

entorse et foulure de l'articulation acromio-claviculaire

Filtre: Cas acceptés avec diagnostic traumatique principal S435_



(2) pour tous les cas avec diagnostic traumatique principal