

## entorse et foulure de parties autres et non précisées de la ceinture scapulaire

Filtre: Cas acceptés avec diagnostic S43.7\_

Nombre de cas par année	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Extrapolation du nombre de cas par année	593	484
dont cas avec diagnostic isolé	408	408

Socio-démographie	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Age moyen	39.2	38.6
Age médian	40.0	39.0
Proportion des accidents professionnels	28%	27%
part des femmes	28%	26%

Frais de traitement (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des frais de traitement	1'931	1'377
Médiane des frais de traitement	391	366
10% des cas ont des frais de traitement inférieurs à	50	50
10% des cas ont des frais de traitement supérieurs à	2'776	2'188
Part de ces 10% de cas par rapport au total des frais	72%	64%

Total des prestations d'assurance (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des prestations	4'075	2'514
Médiane des prestations	907	757
10% des cas ont des prestations inférieures à	70	75
10% des cas ont des prestations supérieures à	5'656	3'696
Part de ces 10% de cas par rapport au total des prestations	78%	70%

Jours indemnisés	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre de cas avec indemnité journalière par année	189	144
Part de cas avec indemnité journalière	32%	30%
Moyenne des jours indemnisés (sans rentes)	13	8
Médiane des jours indemnisés (sans rentes)	0	0



Rentes	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre moyen de cas avec décès par année	0	0
Nombre moyen de cas avec IR par année	1	0
Part de cas avec IR	0%	0%
Degré d'invalidité moyen (tous les cas)	0.0%	-%
Degré d'invalidité moyen (cas avec IR)	16%	-%
Somme des degrés d'invalidité par année	10%	-%
Cas avec indemnités pour atteinte à l'intégrité	0%	0%

Extrapolation sur la base d'un échantillon de 154 cas reconnus LAA avec diagnostic(s) S437\_ en 2011-2015, dont 121 avec ce(s) diagnostic(s) comme diagnostic principal

(1) Pour les cas avec plusieurs diagnostics traumatiques, le diagnostic traumatique principal est celui dont les frais de traitement sont les plus élevés par rapport à la moyenne de tous les cas présentant ledit diagnostic.

## entorse et foulure de parties autres et non précisées de la ceinture scapulaire

Filtre: Cas acceptés avec diagnostic traumatique principal S437\_



(2) pour tous les cas avec diagnostic traumatique principal